

<p>Nombre: Metamizol sódico (Dipirona) Condición de venta: sin receta médica Clasificación: analgésico - antipirético Disponible en:</p>	<p>Nombres de marca:</p>
--	---------------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento de estados dolorosos y febriles.

2.- Administración (oral, rectal, inyectable)

- Rango y frecuencia

Adultos: 300mg 1 a 3 veces al día, sin superar los 3g diarios.

Niños: 7 a 25 mg por kilogramo de peso, sin superar los 40mg por kilogramo al día.

- Consejo de cómo administrarlo

En el caso de tratarse de la solución inyectable, debe aplicarla lentamente para evitar una caída de la **presión sanguínea**.

- Uso prolongado

No debe utilizar este medicamento durante un periodo prolongado o en altas dosis, a menos que su médico lo haya indicado.

Si su médico le indicó su uso por un periodo de tiempo prolongado, debe realizarse en forma periódica exámenes de sangre para descartar un posible riesgo **hematológico**.

3.- Precauciones

- Consumo de alcohol

No debe consumir alcohol mientras se encuentre en tratamiento con metamizol sódico, ya que este puede aumentar los efectos del alcohol.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

No debe usar metamizol sódico en niños menores de 3 meses o que pesen menos de 5 kilogramos, a menos que su médico lo indique.

En el caso de los supositorios, no debe utilizarlos en niños menores de 3 años, a menos que su médico lo indique

- Precauciones especiales

Debe avisar a su médico si presenta síntomas como fiebre y ulceraciones bucales. No debe administrarse metamizol sódico inyectable aquellas personas que sufre de **hipotension**.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia metamizol sódico, isopropilaminofenazona, propifenazona, fenazona, fenilbutazona o a ácido acetilsalicílico (aspirina).

Si ha presentado síntomas de alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Si padece de **porfiria hepática** o déficit congénito de glucosa-6-fosfato-dehidrogenasa.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente clorpromazina, ciclosporina, fenilbutazona, warfarina, quinidina, alcohol.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **asma**, **taquiarritmias**, **glaucoma**, **hipertrofia prostática**, **megacolon**, **agranulocitosis**.

- Exámenes de laboratorio

Metamizol sódico puede alterar los resultados de exámenes de **glucosa** en orina, por lo que debe avisar que se encuentra tomando este medicamento antes de practicarse el examen.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: fiebre, ulceraciones bucales, anales o genitales, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, molestias para tragar, sudor frío, **vértigo**, náusea, pérdida del color de la piel, dificultad para respirar, inflamación de la cara, prurito, **taquicardia**, **erupciones** de color violeta en la piel.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: orina de color rojizo.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: escalofríos, vértigo, náuseas, disminución en la frecuencia para orinar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.