

Nombre: Naproxeno (I) hasta 275 mg Condición de venta: sin receta médica Clasificación: Analgésico, Antiinflamatorio Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado en el alivio de procesos inflamatorios y dolorosos de tejidos blandos y músculo esqueléticos y para reducir la temperatura en cuadros febriles.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

- Dosis adultos:

- ❖ La dosis recomendada en adultos para las **afecciones de tipo reumático articular** (osteoartritis, artritis reumatoídea, etc.) son 250, 375, 500 mg. cada 12 horas.
- ❖ En **ataque agudo de gota**, la dosis recomendada es de 750 mg. seguidos de 250 mg. cada 8 horas, hasta el alivio de los síntomas.
- ❖ La **dosis analgésica** de naproxeno es 500 mg. seguidos de 250 mg. cada 6 u 8 horas.

- Dosis pediátrica:

- ❖ Para el tratamiento de la artritis reumatoídea, se recomiendan dosis de 10 mg/kg al día dividido en dos dosis.
- ❖ Como antipirético se recomiendan 2.5 a 7.5 mg/kg. Según indicación médica.

Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda que tome naproxeno junto con las comidas, para evitar la posible irritación estomacal.

- Uso prolongado

Puede causar irritación estomacal, inflamación del hígado, problemas a los riñones y hemorragias, por lo que no debe tomar este medicamento por periodos prolongados a menos que sea por indicación de su médico.

No se debe usar este medicamento por mas de 7 días en caso de dolor o mas de tres días en caso de fiebre, sin consultar al médico

3.- Precauciones

- **Mayores de 60 años**

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, se recomienda comenzar el tratamiento con dosis menores, por lo que debe ser indicado por un médico.

- **Consumo de alcohol**

Debe evitar tomar alcohol junto con este medicamento, ya que esta combinación puede ser muy tóxica para su hígado.

- **Manejo de vehículos**

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia**

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

No se recomienda su uso en niños menores de 2 años, a menos que su médico lo indique.

Este medicamento en niños menores de 12 años, únicamente debe usarse si se lo receta su médico.

- **Precauciones especiales**

Este tipo de medicamentos interfiere en la coagulación de la sangre, por lo que se recomienda que deje de tomarlo por lo menos tres días antes de someterse algún tipo de cirugía.

Debe evitar la exposición prolongada al sol durante el tratamiento con naproxeno, ya que este medicamento puede aumentar la sensibilidad de su piel al sol, provocando la aparición de manchas rojas.

Usted debe consultar a su médico antes de usar este medicamento si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca)

Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a naproxeno, ácido acetilsalicílico (aspirina) u otro antiinflamatorio.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes contenidos en la formulación.

No debe usar este medicamento en el periodo inmediato a un by pass coronario

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente ácido acetilsalicílico (aspirina), bicarbonato sódico, hidróxido de aluminio, atenolol, propanolol, ciclosporina, ciprofloxacino, prednisolona, dexametasona, furosemida, hidroclorotiazida, metotrexato, morfina, amoxicilina, probenecid, ácido valproico, sales de litio.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **asma**, trastornos **gastrointestinales**, **coagulopatías**, **hemorragias**, **diabetes mellitus**, **lupus eritematoso sistémico**, **anemia**, **epilepsia**, **enfermedad de Parkinson**, **cálculos renales**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, con o sin hinchazón de las piernas, dolor de pecho, **úlceras pépticas** con vómitos con sangre, **heces** con sangre, disminución en la función renal, aumento de la **presión arterial**.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: náuseas, diarrea, dolor abdominal, **estreñimiento**, dolor de cabeza, coloración amarilla de la piel o las mucosas.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas severas, vómitos, dolor de cabeza, confusión. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.