

Nombre: Nistatina Condición de venta: con receta médica Clasificación: antimicótico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento de la candidiasis vaginal, vulvares o vulvovaginales causadas por candida albicans.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de 1 óvulo 1 ó 2 veces al día por 2 semanas.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Lave la zona afectada antes de administrar el medicamento, para eliminar escamas y restos del último tratamiento. Se recomienda aplicar el medicamento durante la noche.

Es recomendable que utilice ropa interior de algodón y que la cambie todos los días.

No se recomienda el uso de protectores diarios, ya que estos pueden aumentar la humedad en la zona.

- Uso prolongado

Debe usarlo solamente durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existen recomendaciones especiales para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

La nistatina no ha provocado daños en el feto, administrada por vía vaginal durante las 3 - 6 últimas semanas del embarazo, se evitan las infecciones candidiásicas en la boca del bebe.

Generalmente este medicamento se inserta en la vagina con un aplicador, si se encuentra embarazada, debe consultar con su médico si puede utilizar el aplicador para insertar el medicamento.

- **Lactancia**

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta con su pediatra.

- **Precauciones especiales**

En el caso del tratamiento vaginal no debe suspender su aplicación durante la menstruación. Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

4. - Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a nistatina u otros antifúngicos.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5. - Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque el riesgo de interacciones es bajo.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: episodios de irritación, reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como hinchazón, dificultad para respirar, debe acudir de inmediato a su médico o al centro asistencial más cercano, llevando el envase del medicamento.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón, vaginitis, eritema o dermatitis de contacto.

7. - Sobredosis

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.