

Nombre: Nitroglicerina Condición de venta: con receta médica Clasificación: antianginoso Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el alivio y prevención de ataques de angina de pecho, como inductor de hipotensión durante el intra operatorio y como terapia coadyuvante en la insuficiencia cardiaca congestiva, asociada o no a infarto agudo al miocardio.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Vía I.V: administrar previa dilución en suero glucosado o salino 15 a 100 mg./minuto, con monitoreo continuo de la presión arterial.

Por vía oral se recomienda usar 1 comprimido de 0.6 mg. según si médico le indique.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda que la forma oral la tome 30 minutos antes de las comidas, o 1 a 2 horas después de las comidas.

No coma, beba o fume durante 5 a 10 minutos después de haber consumido este medicamento.

No consuma más medicamento ni con más frecuencia que la indicada por su médico.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con nitroglicerina.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de nitroglicerina

- Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe conversar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada o desea estarlo.

- Lactancia

Este medicamento puede pasar en pequeñas cantidades a la leche materna, debe consultar al médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

No existen estudios que avalen el uso de este medicamento en niños, por lo que su pediatra debe evaluar la necesidad de utilizar nitroglicerina.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

No debe dejar de tomar este medicamento en forma brusca, su médico debe indicarle como ir reduciendo gradualmente la dosis.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a nitroglicerina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: propranolol, enalapril, atenolol, u otros medicamento para disminuir la **presión arterial**.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de anemia, glaucoma, hipotiroidismo, ataque al corazón reciente.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico:

visión borrosa, sequedad de boca, dolor de cabeza severo y en forma prolongada, **rash**.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: mareos, enrojecimiento del cuello y la cara, pulso más lento, dolor de cabeza, náuseas o vómitos leves.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: labios, uñas o las palmas de las manos de color azul, mareos o fatiga, sensación de presión en la cabeza, dificultad para respirar, debilidad, ritmo irregular del corazón, fiebre, convulsiones.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.