

Nombre: Nonoxynol Condición de venta: sin receta médica Clasificación: espermicida vaginal Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado como anticonceptivo de acción local.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

Se utilizan 100 mg por lo menos 15 minutos antes de una relación sexual.

Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicarlo siguiendo las instrucciones 15 minutos antes de mantener la relación sexual y no debe esperar más de 1 hora luego de aplicado el medicamento.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Este medicamento esta indicado en personas que se encuentran en edad fértil.

- Embarazo

Este medicamento es para evitar el embarazo

Lactancia

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño.

- Precauciones especiales

Este medicamento no protege del contagio de infecciones de transmisión sexual como VIH, gonorrea, sífilis, etc.

Sólo debe usar este medicamento en la vagina, y no se debe utilizar durante el periodo menstrual.

Para una mayor eficacia del medicamento se recomienda no aplicarse lavados vaginales hasta después de 6 horas del acto sexual.

Este anticonceptivo no es de una eficacia menor que otros métodos, por lo tanto si para usted es muy importante que el embarazo no ocurra, discuta el método mas adecuado con su médico

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a nonoxynol.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente salicilatos tópicos, sulfonamidas de uso vaginal.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de alguna alergia, irritación o infección genital, si acaba de tener un parto o un **aborto**, si tiene antecedentes de **shock tóxico**, irritación de la vagina.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: signos de shock tóxico (confusión, mareos, fiebre, dolor muscular), rash, palidez, irritación, dificultad para orinar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: flujo vaginal temporal, sequedad vaginal y cambio en el olor.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: confusión, mareos, fiebre, dolor muscular. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona