

Nombre: Noretisterona Condición de venta: con receta médica Clasificación: anticonceptivo hormonal Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado como coadyuvante de la terapia de reemplazo hormonal estrogénica.

2.- Administración (oral)

▪ Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de 1 mg diario en conjunto con la terapia de reemplazo hormonal estrogénica.

▪ Consejo de cómo administrarlo

Debe seguir las indicaciones de su médico acerca de cómo tomar este medicamento, es recomendable que tome este medicamento a una misma hora todos los días, para evitar olvidarlo, si olvida tomar una dosis puede hacerlo en las siguientes 12 a 24 horas. Si se suspende el medicamento por un período más prolongado puede producirse hemorragia irregular.

▪ Uso prolongado

Este medicamento debe ser consumido un año después de haber comenzado la menopausia y si se ha descartado la posibilidad de un embarazo.

Debe tomar este medicamento por todo el tiempo que su médico le indique, evitando olvidar alguna dosis.

Recuerde que debe acudir periódicamente a su ginecólogo.

3.- Precauciones

▪ Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

▪ Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

▪ Embarazo

No debe tomarlo durante el embarazo, y debe descartar un posible embarazo antes de comenzar el tratamiento.

- **Lactancia**

Este medicamento pasa en pequeñas cantidades a la leche materna, sin embargo no se han observado efectos adversos en el lactante, por lo que se puede utilizar para evitar el embarazo durante el periodo de lactancia.

- **Precauciones especiales**

Su médico debe hacerle reconocimientos en forma periódica durante los primeros 6 meses de tratamiento.

Si usted fuma cigarrillos, debe tomar en cuenta que la combinación de tabaco con este medicamento aumenta el riesgo de efectos secundarios **tromboembólicos** o **hepáticos** serios.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a noretisterona u otra hormona.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: aminoglutenimida, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, rifampicina.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **diabetes mellitus** graves, antecedentes de colesterol alto, procesos **trombóticos** o **tromboembólicos**, arteriales o venosos, cáncer de mamas o **endometrio**, trastornos **cardiovasculares** o **cerebrovasculares**, **hiperplasia endometrial**, depresión, **epilepsia**, dolores de cabeza, **osteoporosis**, **asma**.

- **Exámenes de laboratorio**

Puede interferir con ciertas pruebas de laboratorio por lo que debe informar la utilización de este medicamento antes de realizarse los exámenes.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: Si usted presenta alguno de los siguientes efectos: cambios en la hemorragia menstrual, depresión, rash, aparición inexplicable de flujo de leche.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: dolor abdominal leve, dolor de cabeza leve, cambios en el carácter, nerviosismo, ganancia de peso, acné, pérdida del apetito sexual.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, en niñas ligero sangrado vaginal.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.