

Nombre: Oximetazolina nasal Condición de venta: sin receta médica Clasificación: descongestionante nasal Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado para el alivio temporal de la congestión nasal debida a : resfrío común , sinusitis, fiebre de heno u otras alergias respiratorias de las vías superiores.

2.- Administración (nasal)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

- Adultos y niños mayores de 6 años: 2 a 3 gotas de solución al 0.05% dos veces al día hasta por 3 días.
- Niños de 2 a 5 años: a 3 gotas de solución al 0.025% dos veces al día hasta por un período de 3 días.

- Consejo de cómo administrarlo

Si utiliza las gotas debe aplicarlas estando recostado y con la cabeza hacia atrás luego de aplicar debe mantener la posición por unos minutos para evitar que el medicamento se derrame.

- Uso prolongado

No use este medicamento por mas de 7 días, si los síntomas continúan o empeoran, debe consultar, nuevamente, con su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos pueden ser más sensibles a los efectos adversos de este medicamento.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- **Embarazo**

No se han reportado efectos adversos en el **feto**, con el uso de este medicamento en mujeres embarazadas, no obstante es preferible que usted consulte al médico antes de usar este medicamento

- **Lactancia**

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño, no obstante es preferible que consulte al médico la conveniencia de usar este medicamento si está amantando

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra, ya que los niños son más sensibles a los efectos adversos de oximetazolina. No se recomienda su uso en niños menores de 2 años.

- **Precauciones especiales**

No debe usarlo si la solución esta turbia o si cambia de color.

Es importante que no utilice una cantidad mayor que la que se le ha indicado.

Luego de utilizar el medicamento debe limpiar el aplicador.

Este medicamento es de uso personal, no debe compartirlo con otras personas, ya que puede causar el contagio de alguna infección.

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a oximetazolina u otras soluciones nasales.

Si presenta glaucoma de ángulo cerrado.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe señalarle al médico todos los medicamentos que está usando ya sea con o sin receta. En este caso particular se han detectado interacciones con los medicamentos siguientes: **Antidepresivos (inhibidores de la monoaminoxidasa y tricíclicos)**

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de diabetes mellitus, **hipertensión, hipertiroidismo, glaucoma.**

6.- Efectos adversos

Si este medicamento es utilizado por periodos cortos de tiempo o en dosis bajas, hay pocas posibilidades de efectos adversos. Si se usa por periodos prolongados de tiempo y/o en dosis altas se pueden producir efectos serios

- **Serios**

Si usted presenta alguno de los siguientes efectos: narices muy tapadas, aumento excesivo de moco nasal, mareos, dolor de cabeza, aumento de la sudoración, náuseas, vómitos, taquicardia, nerviosismo, debilidad, debe acudir de inmediato a su médico o al centro asistencial más cercano, llevando el envase del medicamento.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera

de estos efectos persisten o se intensifican: ardor, sequedad nasal, estornudo, aumento de descarga nasal.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: **arritmias**, dolor de cabeza, nerviosismo, dificultad para dormir. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.