

<b>Nombre:</b> Oximetazolina oftálmica <b>Condición de venta:</b> sin receta médica <b>Clasificación:</b> descongestionante oftálmico <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado para el alivio del enrojecimiento del ojo debido a irritaciones oculares menores.

### 2.- Administración (oftálmica)

#### - Rango y frecuencia

Dosis adultos: 1 gota de concentración de 0,05% cada 6 horas, según necesidad.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicar el medicamento sobre la **conjuntiva**, sin poner en contacto la punta del envase con el ojo, debe dejar caer la gota sobre el ojo. El envase debe mantenerse cerrado de forma ajustada.

Debe lavarse las manos antes y después de aplicarse este medicamento.

#### - Uso prolongado

Si después de 3 a 4 días de uso los síntomas continúan o empeoran, debe acudir al oculista, ya que puede tratarse de un problema **ocular** grave.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

#### - Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

#### - Embarazo

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el **feto**.

#### - Lactancia

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño.

#### - Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- **Precauciones especiales**

No debe usarlo si la solución esta turbia o si cambia de color.

Es importante que no utilice una cantidad mayor que la que se le ha indicado.

**4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a oximetazolina u otras soluciones oftálmicas.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

En el caso que padezca de **glaucoma** de ángulo estrecho o predisposición a este.

**5.- Interacciones**

- **Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de alguna enfermedad o infección que afecte a los ojos, **hipertensión, hipertiroidismo, glaucoma**.

**6.- Efectos adversos**

**Si este medicamento es utilizado por periodos cortos de tiempo o en dosis bajas, hay pocas posibilidades de efectos adversos. Si se usa por periodos prolongados de tiempo y/o en dosis altas se pueden producir efectos serios los cuales pueden ser:** aumento de la irritación ocular, mareos, dolor de cabeza, aumento de la sudoración, náuseas, nerviosismo, debilidad, en caso de producirse cualquiera de estos efectos debe acudir de inmediato a su médico o al centro asistencial más cercano, llevando el envase del medicamento.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: ardor, visión borrosa, pupilas dilatadas.

**7.- Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: insomnio, agitación, **arritmias**. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

**8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.