

Nombre: Omeprazol

Condición de venta: con receta
médica retenida

Clasificación: antiácido

Disponible en:

Nombres de marca:

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

§ Composición y presentación:

§ Principio Activo:

§ Excipientes:

1. - ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento de

- ✓ Úlcera duodenal.
- ✓ Úlcera gástrica.
- ✓ Erradicación de helicobacter pylori asociado a la enfermedad ulcerosa péptica en terapia combinada con antibacterianos.
- ✓ Esofagitis por reflujo.
- ✓ Enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática.
- ✓ Síndrome de Zollinger-Ellison.

2. - Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

✓ Adultos:

§ Úlcera duodenal: 20 mg. una vez al día por 4 semanas

§ Úlcera gástrica: 40 mg. una vez al día por 4 a 8 semanas

§ Erradicación de helicobacter pylori: Se recomienda iniciar la terapia con omeprazol 20 mg. dos veces al día o 40 mg una vez al día en combinación con antibióticos, luego se recomienda seguir la terapia con 20 mg. de omeprazol por 18 días en los pacientes que padecen de úlcera duodenal activa.

§ Esofagitis activa: 20 mg. una vez al día por 4 a 8 semanas

§ Enfermedad por reflujo gastroesofágico: 20 mg. al día por 4 semanas.

§ Estados de hipersecreción como síndrome de Zollinger -Ellison: 60 mg. una vez al día, en caso que se necesiten dosis mayores a 80 mg. al día, éstas deben ser dadas en dosis divididas.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomarlo antes de las comidas, acompañado con un vaso de agua.

- Uso prolongado

No debe utilizar este medicamento en forma indefinida, su médico le indicará por cuánto tiempo debe seguir el tratamiento.

3. - Precauciones

- Mayores de 60 años

Las reacciones adversas pueden ser más comunes y más severas en pacientes ancianos.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol, ya que este puede aumentar las molestias estomacales.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe señalar al médico, que está embarazada o puede estarlo, antes de usar este medicamento.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

En niños, sólo debe utilizarlo por indicación de su pediatra, quien debe evaluar el **riesgo / beneficio** de su administración.

- Precauciones especiales

Si tiene problemas para tragar, puede abrir las cápsulas y disolver su contenido en un líquido ligeramente ácido (por ejemplo: jugo de naranja), se debe tomar antes de 30 minutos.

Utilice este medicamento por todo el tiempo que su médico se lo indicó aunque siente que los síntomas han desaparecido.

Evite el cigarrillo, ya que éste junto al alcohol aumentan la acidez estomacal y pueden afectar la acción del medicamento.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al omeprazol, pantoprazol, rabeprazol o lanzoprazol.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: diazepam, alprazolam, carbamazepina, ciclosporina, digoxina, disulfiram, fenitoína, metrotrexato, warfarina, cianocobalamina, ketoconazol y prednisolona.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular**, problemas a la sangre o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

- Exámenes de laboratorio

Este medicamento puede alterar los resultados de los análisis de **transaminasas** hepáticas en sangre, por lo que debe informar que esta utilizando este medicamento, antes de hacerse este examen de sangre.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: sangrado o contusión poco usual, piel y ojos amarillos, ~~hegas~~ lesiones en la boca, **erupción** de la piel, picazón, hinchazón, fiebre, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: **estreñimiento** leve, diarrea leve, gases, mareos, dolor de cabeza, náuseas, **vértigo** y dolor muscular.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: visión borrosa, confusión, mareos, sequedad de boca, dolor de cabeza, náuseas, palpitaciones, inusual aumento del ritmo del corazón. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.