

PICOSULFATO DE SODIO SOLUCION PARA GOTAS / COMPRIMIDOS

Lea cuidadosamente éste folleto antes de empezar a tomar este medicamento. Si tiene alguna duda o desea más información, consulte a su médico o al farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

¿Qué contiene Picosulfato de sodio?

Cada 10 gotas (según lo aprobado en registro) contienen:

Picosulfato de sodio: 5 mg

Excipientes: Según lo aprobado en registro

Cada comprimido contiene:

Picosulfato de sodio: 5 mg

excipientes :Según lo aprobado en registro

¿Qué tipo de medicamento es Picosulfato de sodio?

Laxante

¿Para qué se utiliza este medicamento?

Picosulfato de sodio es usado para facilitar la defecación. Es importante señalar que la primera elección es una alimentación rica en fibra, ejercicio, tomar bastante agua; si estas medidas no resultan se recurre a un laxante.

Cuando se recurre a un laxante debe ser en la dosis más baja efectiva y por el menor tiempo posible.

¿Quién no debe tomar este medicamento?

- Niños menores de 2 años
- En caso de dolor abdominal de causa indeterminada, náuseas, vómitos o fiebre, cuando hay obstrucción intestinal, apendicitis, deshidratación severa
- Personas alérgicas al picosulfato o a cualquiera de los excipientes

¿Qué debe tenerse en cuenta antes de tomar este medicamento?

El uso frecuente y prolongado puede producir efectos dañinos para su salud. No usar por más de ocho días

El uso frecuente y prolongado de este u otro laxante puede crear hábito.

¿Qué ocurre si está embarazada o en período de lactancia?

No se recomienda su uso durante el embarazo y lactancia.

Picosulfato de sodio sólo debe tomarse durante el embarazo por consejo médico.

No se ha establecido si Picosulfato de Sodio pasa a la leche materna. Por lo tanto, no se recomienda la lactancia materna cuando se está bajo tratamiento con Picosulfato de sodio, a menos que el médico así lo indique,

¿Qué ocurre si toma otros medicamentos mientras está tomando Picosulfato de sodio?

Ciertos, medicamentos con o sin receta médica pueden interactuar con la acción de este medicamento produciendo efectos no deseados muchos de ellos graves para el organismo.

Si no está seguro si puede tomar otros medicamentos mientras toma Picosulfato de sodio consulte a su médico o al farmacéutico.

Se han descrito interacciones con diuréticos, digitálicos, antiarritmicos

¿Cómo debe tomarse?

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante las dosis usuales recomendadas son:

Gotas:

Adultos y adolescentes: 10-20 gotas en la noche (5 a 10 mg).

En casos severos, puede aumentarse hasta 30 gotas (15 mg).

Niños mayores de 4 años. 5-10 gotas en la noche(2,5 a 5 mg)

Comprimidos.

Adultos y niños > 10 años: 1-2 compr. (5-10 mg)

Niños: 4-10 años: ½ a 1 compr. (2,5 a 5 mg)

Es preferible tomarlo en la noche para evacuar a la mañana siguiente.

No tome más o con mayor frecuencia que la que le indique el médico.

¿Durante cuánto tiempo?

No usar por más de ocho días

¿Qué efectos adversos puede causar éste medicamento?

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Se han descrito para este medicamento dolor abdominal, diarrea, riesgo de pérdida de potasio.

Si advierte cualquier otro efecto, aunque no se le indique en la lista anterior avise a su médico.

¿Cómo debe conservarse este medicamento?

Deben conservarse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y seco. No tome este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. No saque medicamento del envase hasta el momento de usarlo y después guárdelo siempre en su envase correspondiente.

Presentación:

Según lo aprobado en registro.

REVISADO EL 21 DE FEBRERO DEL 2007