

Nombre: Picrato de butambeno Condición de venta: sin receta médica de uso tópico Clasificación: anestésico local Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado como antiséptico y anestésico para el alivio de dolores leves y picazón de la piel, causados por quemaduras, picaduras de insectos.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

Se debe aplicar sobre la zona afectada 3 o 4 veces al día, según la necesidad.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicar sobre la piel limpia y cubriendo toda la zona afectada. Puede cubrir la zona afectada con una gasa estéril para evitar que el medicamento manche su ropa.

Se debe lavar las manos antes de aplicar este producto.

- Uso prolongado

Sólo debe utilizarlo por unos días, hasta que la lesión se haya curado. Si después de siete días de uso, los síntomas no mejoran o empeoran debe consultar a su médico, ya que puede requerir de otro tratamiento

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

No se ha observado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el **feto**.

- Lactancia

No se ha observado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño. No se debe poner en la zona de las mamas.

- Lactantes y niños

Se recomienda consultar al médico antes de usarlo en niños, especialmente en menores de 2 años, ya que la piel de los niños es más susceptible a absorber este medicamento y presentar mayor sensibilidad a los efectos adversos de picrato de butambeno.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

No debe utilizar este medicamento en zonas extensas de piel, especialmente si la piel presenta lesiones.

Debe tener la precaución de no aplicar sobre los ojos, la boca o la nariz.

Debe evitar poner en contacto el medicamento con la ropa, ya que la puede manchar; además puede decolorar el cabello.

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a picrato de butambeno u otro anestésico de uso tópico. Debe avisar a su médico si ha presentado síntomas de alergia a preservantes.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: visión borrosa, confusión, convulsiones, mareos, dolor de cabeza, temblores, zumbido de oídos, ritmo irregular del corazón, dificultad para respirar, ansiedad, excitación, nerviosismo.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

