

<b>Nombre:</b> Pirantel Pamoato <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> antihelmíntico <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Para el tratamiento de infecciones **gastrointestinales** causadas por **helmintos**. Los helmintos son parásitos invertebrados capaces de causar una gran variedad de enfermedades al ser humano como ascariasis, oxiuros, etc

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 11 mg./Kg. De peso en una sola dosis.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Se aconseja administrar el medicamento a toda la familia, ya que aunque no se presenten síntomas pueden encontrarse contagiados.

Esta medicina puede tomarse con o sin comida.

#### - Uso prolongado

Debe usarlo por todo el periodo que su médico le señale

### 3.- Precauciones

#### - Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de pirantel pamoato.

#### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede provocar mareos, por lo que tenga cuidado si debe conducir o manejar alguna maquinaria mientras se esté en tratamiento con este medicamento.

#### - Embarazo

Debe asegurarse que su médico sabe que está embarazada, antes de tomar este medicamento.

#### - Lactancia

Debe consultar al médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

#### - Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

#### - Precauciones especiales

Si después de completar el tratamiento sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar, nuevamente, con su médico.

Si está tomando este medicamento para parásitos intestinales como áscaris y oxiuros, consulte con su médico si debe tomar suplementos de hierro.

Si toma teofilina dígaselo a su médico, su dosis puede cambiarse.

Haga que examinen a todos los miembros de la familia porque la infección de oxiuros y áscaris puede transmitirse con rapidez de unos a otros.

Para evitar infectarse nuevamente, lave su ropa de cama y pijamas en agua caliente con jabón.

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

No use pirantel si usted está siendo tratado de miastenia gravis o está tomando piperazina.

#### 5.- Interacciones

##### - Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente teofilina.

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de algún tipo de disfunción hepática.

#### 6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: sarpullido, urticaria o picazón.

##### - Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: falta de apetito, náuseas, vómitos, calambres estomacales, dolor de cabeza, somnolencia, irritación, insomnio.

#### 7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: espasmos, debilidad muscular, sensación de mareo, colapso, dificultad para respirar, rash.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### 8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.

