

<b>Nombre:</b> Piroxicam tópico <b>Condición de venta:</b> sin receta médica de uso tópico <b>Clasificación:</b> Analgésico, Antipirético, Antiinflamatorio <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

#### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento de dolor e inflamación en casos de osteoartritis, tendinitis, torceduras, lumbagos, etc.

#### 2.- Administración (tópica)

##### - Rango y frecuencia

Se puede aplicar tres a cuatro veces al día con un suave masaje sobre la zona afectada.

##### - Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicarlo sobre la piel limpia en cantidad necesaria para abarcar toda la zona afectada, se deben lavar las manos antes y después de la aplicación. No debe vendar la zona afectada.

##### - Uso prolongado

Le puede causar problemas de irritación y ardor en la zona de aplicación.

El uso prolongado debe realizarlo bajo supervisión médica.

#### 3.- Precauciones

##### - Embarazo

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

##### - Lactancia

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

##### - Lactantes y niños

Se recomienda consultar al médico antes de usarlo en niños, especialmente en menores de 2 años.

##### - Precauciones especiales

Debe utilizarlo sólo sobre la piel sana, sin heridas ni lesiones abiertas. Debe evitar la aplicación en los ojos o mucosas (si esto ocurre lave con abundante agua).

#### 4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si presenta heridas o irritación en la zona afectada.

No debe utilizarlo si ha presentado síntomas de alergia al medicamento o a otros medicamentos como el ácido acetilsalicílico (aspirina).

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

#### **5. - Interacciones**

##### **- Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

#### **6. - Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

##### **- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

#### **7. - Sobredosis**

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha aplicado.

#### **8. - Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.