

Nombre: Propiltiouracilo Condición de venta: con receta médica Clasificación: agente antitiroideo Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en:

- Tratamiento del hipertiroidismo.
- Tratamiento previo a la cirugía o radioterapia.
- Tratamiento coadyuvante de la tirotoxicosis de la tormenta tiroidea.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

❖ Adultos:

- Inicio de terapia: 300 mg. Diarios administrados en tres dosis iguales cada 8 horas, algunos pacientes requieren de dosis iniciales de 400 o hasta 600 mg. Al día.
- Dosis de manutención: de 100 a 150 mg. Al día.

❖ Niños:

- Niños de 6 a 10 años: 50 a 100 mg. Divididos en dosis cada 6 a 8 horas.
- Niños de 10 años y mayores: 150 a 300 mg. Divididos en dosis cada 6 a 8 horas.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar el medicamento junto con un vaso de agua.

- Uso prolongado

Debe acudir periódicamente donde su médico para que evalúe su tratamiento.

Si lleva un tiempo tomando el medicamento no debe dejar de tomarlo sin consultar con su médico, ya que se pueden presentar efectos adversos severos.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con propiltiouracilo.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto** si se utiliza una dosis muy alta durante el embarazo, es poco probable que cause daño en el **feto**, si se usa en la cantidad y frecuencia establecida por su médico.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra, quien le indicará las dosis adecuadas.

- Precauciones especiales

Antes de someterse a alguna cirugía (incluso dental) o tratamiento de emergencia, debe avisar al médico que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

Debe avisar a su médico si durante el tratamiento presenta algún tipo de infección.

No debe tomar o administrarse ningún tipo de vacuna durante el tratamiento con propiltiouracilo, sin la indicación de su médico.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: amiodarona, yoduro de potasio, warfarina, acenocumarol, digoxina.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de alguna enfermedad que afecte a su hígado.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: fiebre, rash o picazón, dolor de espalda, heces negras u oscuras, sangre en la orina o heces, entumecimiento de los dedos de pies, manos o la cara, manchas rojas en la piel, debilidad de las piernas, inflamación de los ganglios, inflamación de las glándulas salivales.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: mareos, náuseas, dolor de estómago, vómitos.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: constipación, sequedad de la piel, dolor de cabeza, dolor muscular,

inflamación del cuello, ganancia de peso, sensación de frío. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.