

Nombre: Pilocarpina oftálmica Condición de venta: con receta médica Clasificación: hipotensor oftálmico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado para el tratamiento del glaucoma en todas sus formas.

2.- Administración (oftálmica)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es de una gota de solución al 1% o al 2% cada 6 a 8 horas. La frecuencia de administración y la concentración de la solución debe ser ajustada hasta obtener la presión intraocular deseada.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicar el medicamento sobre la **conjuntiva**, sin poner en contacto la punta del envase con el ojo, debe dejar caer la gota sobre el ojo. El envase debe mantenerse cerrado de forma ajustada.

Debe lavar sus manos antes y después de aplicar el producto.

- Uso prolongado

Debe visitar regularmente a su médico durante el tratamiento con pilocarpina.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Asegúrese del efecto que tiene sobre usted este medicamento, antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa, ya que este medicamento puede causar visión borrosa.

- Embarazo

Pilocarpina oftálmica puede ser absorbida por el cuerpo, por lo que usted debe conversar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada o desea estarlo

- Lactancia

Este medicamento puede pasar en pequeñas cantidades a la leche materna, debe consultar al médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- Precauciones especiales

No debe usarlo si la solución esta turbia o si cambia de color.

Es importante que no utilice una cantidad mayor que la que se le ha indicado.

Usted puede tener dificultad para ver en luz baja. Tenga cuidado si tiene que manejar de noche

4.- Usted no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia pilocarpina u otras soluciones oftálmicas.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **asma**, alguna enfermedad ocular.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: aumento en la sudoración, temblor muscular, nauseas, vómitos, diarrea, dificultad para respirar, mayor salivación, dolor en los ojos.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: visión borrosa, disminución de la visión nocturna, irritación de los ojos, dolor de cabeza..

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: sudoración, nauseas, vómitos, diarrea, dificultad para respirar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.