

Nombre: Piroxicam Condición de venta: con receta médica Clasificación: Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético. Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el tratamiento de estados inflamatorios y dolorosos agudos.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 10 y 40 mg. al día, según la indicación de su médico.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomarlo en conjunto con alimentos o antiácidos, para evitar irritación estomacal.

- Uso prolongado

Le puede causar problemas estomacales (úlceras), inflamación del hígado, problemas a los riñones y **hemorragias**. Por lo que debe realizar visitas periódicas a su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los problemas estomacales pueden ser más severos en pacientes mayores de 60 años.

- Consumo de alcohol

Si usted toma alcohol junto al medicamento puede aumentar el riesgo de problemas estomacales y **hemorragias**.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Debe consultar al médico antes de usar este medicamento si está amamantando.

- Lactantes y niños

Puede utilizarlo sólo si está indicado por su pediatra y bajo circunstancias específicas.

- Precauciones especiales

Este tipo de medicamentos interfiere en la coagulación de la sangre, por lo que se recomienda dejar de tomarlo por lo menos tres días antes de someterse algún tipo de cirugía.

Evite el consumo de otros antiinflamatorios mientras esté en tratamiento con piroxicam.

Informe a su médico si está en tratamiento con anticoagulantes, medicamentos para la diabetes o diuréticos.

Usted debe consultar a su médico antes de usar este medicamento si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca)

Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si usted tiene **úlceras gastroduodenales**.

Si ha presentado síntomas de alergia al piroxicam o a medicamentos similares como el ácido acetilsalicílico (aspirina).

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Estando embarazada o durante el periodo de lactancia.

No debe usar este medicamento en el periodo inmediato a un by pass coronario

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: medicamentos para la presión, prednisona, warfarina, antibióticos, Itraconazol o Ketoconazol, Penicilamina, Ácido Valproico, Fenitoína, Ciclosporina, Digoxina o Digitoxina, Litio, Metotrexato, Probenecid, Triamtereno o Zidovudina (AZT). No se debe tomar en forma conjunta con otros medicamentos como ácido acetilsalicílico (aspirina) (o similares) a menos que su médico así lo determine.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de **hemorragias, inflamación o úlceras** en el estómago e intestinos, **diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico, anemia, asma, epilepsia, enfermedad de Parkinson, cálculos renales**, o historia de enfermedades al corazón o consumo crónico de alcohol, enfermedades renales o al hígado.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, con o sin adormecimiento de las piernas, dolor en el pecho, **úlceras pépticas** con vómitos con sangre, **melenas**, disminución de la frecuencia para orinar o en la cantidad de orina.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o

se intensifican: náuseas, diarrea leve, constipación leve, dolor de cabeza leve, vértigo, somnolencia, úlceras o dolor en la boca, inusuales temblores o entumecimiento de las manos o los pies, visión azul rojiza; los cuales tienden a desaparecer con el tiempo, pero si continúan o empeoran, consulte con el médico.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, dolor de cabeza severo, confusión y mal estar. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.