

Nombre: Quinidina Condición de venta: con receta médica Clasificación: antiarritmico Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes**

1.- ¿Para qué se usa?:

Quinidina es usada para el tratamiento de las arritmias cardíacas, tratamiento y control de fibrilación auricular establecida, aleteo (flutter) auricular, filtración auricular paroxística, taquicardia auricular paroxística, ritmo paroxístico del tejido de unión auriculo -ventricular, taquicardia ventricular paroxística no asociada a bloqueo cardíaco completo, contracciones prematuras auriculares y ventriculares.

Todas estas patologías son trastornos en el ritmo del corazón que su médico debe determinar.

- 2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 200 – 400 mg. cada 4 a 6 horas.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar el medicamento junto con un vaso de agua, 1 hora antes de las comidas o 2 horas después de comer. Sin embargo, si el medicamento le causa irritación estomacal puede tomarlo junto con las comidas.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis. Si requiere de un tratamiento de por vida debe visitar regularmente a su médico par que este evalúe la eficacia del tratamiento.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con quinidina.

- Manejo de vehículos

Esta medicina puede causar en algunas personas sueño o mareo, ponga especial cuidado si usted debe manejar vehículos o debe operar algún tipo de maquinaria.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto** e incluso provocar contracciones uterinas, usted debe señalar a su médico que está embarazada o puede estarlo.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna. Converse con su médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

No debe dejar de tomar este medicamento sin la autorización de su médico, ya que se puede presentar un empeoramiento de los síntomas de su enfermedad.

Antes de realizarse una cirugía (incluso dental) o tratamiento de emergencia debe avisar al médico que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a quinidina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Si usted padece de lupus o miastenia gravis consulte con su médico antes de iniciar el tratamiento con quinidina.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: warfarina, acenocumarol, digoxina u otro medicamento para el corazón, pimozide, acetazolamida, antiácidos que contengan calcio o magnesio, metazolamida, citrato de potasio o de sodio, ácido cítrico, bicarbonato de sodio.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **asma** o **enfisema pulmonar**, alguna enfermedad a la sangre, alguna infección, **miastenia gravis**, **hipertiroidismo**, **psoriasis**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico, éstos son: visión borrosa o cambios en la visión, mareos, dolor de cabeza, fiebre, zumbido en los oídos o pérdida de la audición, rash, picazón, dificultad para respirar.

Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sabor amargo en la boca, diarrea, pérdida del apetito, náuseas o vómitos leves, dolor de estómago leve.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: letargia, confusión, dolor de cabeza, convulsiones, mareos, vómitos, dolor de estómago, cambios en la visión y audición, fatiga o mareos severos, dificultad para respirar, pérdida de la conciencia.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.