

Nombre: Ranitidina hasta 75m Condición de venta: sin receta médica Clasificación: antiácido Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es utilizado para el alivio del ardor y acidez estomacal.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

Dosis adultos: 75mg al iniciarse las molestias sin sobrepasar los 150mg al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomarlo preferentemente con las comidas o al acostarse, evitando alimentos que causen irritación.

- Uso prolongado

No debe utilizarlo por más de 3 días sin control médico. Si los síntomas persisten consulte al médico. Su uso por periodos prolongados puede enmascarar una enfermedad grave.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Las reacciones adversas pueden ser más comunes y más severas en pacientes ancianos.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol, ya que este puede aumentar las molestias estomacales.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe señalar al médico, que está embarazada o puede estarlo, antes de usar este medicamento.

- Lactancia

Este medicamento pasa a través de la leche materna, puede producir acidez estomacal o excitación en los lactante, por lo que no debe utilizarlo durante la lactancia.

- Lactantes y niños

No es recomendable utilizar en niños. Su pediatra debe evaluar el **riesgo / beneficio** de su administración.

- Precauciones especiales

El tabaco de los cigarrillos disminuye la actividad de la ranitidina, por ello es preferible que no fume cuando este tomando el medicamento.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a la ranitidina o a cimetidina, famotidina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente antiácidos, fluoxetina, ácido acetilsalicílico, propranolol, cafeína, diazepam, ketoconazol, lidocaína, fenitoína, procainamida, teofilina, warfarina, triazolam.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de alguna alteración renal o **inmunológica**.

- Alimentos

No debe consumir bebidas carbonatadas (gaseosas), frutas y jugos ácidos, bebidas que contengan cafeína y otras comidas y jugos ácidos que puedan irritar el estómago o interferir con la acción terapéutica de ranitidina.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: palpitaciones, disminución en el ritmo del corazón, **hemorragias** inusuales, fiebre, escalofríos, aparición de infecciones.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: dolor de cabeza, **fatiga**, mareos, náusea, dolor abdominal leve, diarrea leve, **constipación**, visión borrosa, disminución en el deseo o función sexual, **insomnio**, enrojecimiento de la piel, palidez.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: vómitos, diarrea, problemas respiratorios, dificultad para hablar, **taquicardia**, **delirio**. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.- Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.