

Nombre: Reserpina Condición de venta: con receta médica Clasificación: hipotensor Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes**

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial .

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 0.5 mg. al día, por 1 a 2 semanas, luego la dosis de mantención varía entre los 0.1 a 0.25 mg.

- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar este medicamento junto con las comidas o con leche para evitar efectos secundarios como náuseas, vómitos, dolor estomacal.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis. Se recomienda acudir periódicamente al médico para que este evalúe su condición.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, particularmente se pueden presentar mareos o somnolencia, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con reserpina.

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de reserpina.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al feto, usted debe señalarle a su médico que se encuentra embarazada o puede estarlo, antes de tomar este medicamento.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede causar dificultad para respirar, disminución de la temperatura, pérdida del apetito en el lactante, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Antes de realizarse una cirugía (incluso dental) o tratamiento de emergencia debe avisar al médico que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

Este medicamento puede causar sequedad de boca, la cual puede aliviarse chupando caramelos.

Aunque se sienta bien no debe dejar de tomar el medicamento sin consultar a su médico, su presión arterial aún podría estar elevada.

Usted debe visitar periódicamente a su médico, para evaluar su presión y tratamiento.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a reserpina.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

Usted no debe tomar este medicamento si ha estado en tratamiento con algún **antidepresivo** del tipo **inhibidores de la monoamino oxidasa** en las últimas dos semanas.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: furazolidona, seliginina, isocarboxazida, medicamentos para el control del apetito, **asma**, resfrío, tos, fiebre, o descongestionantes.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **alergias**, dificultades respiratorias como **asma**, **epilepsia**, **ulcera estomacal**, **colitis ulcerativa**, depresión, **enfermedad de Parkinson**, **feocromocitoma**.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico, éstos son: somnolencia, impotencia sexual, debilidad, depresión, inhabilidad para concentrarse, nerviosismo, ansiedad, pesadillas.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: diarrea, sequedad de boca, pérdida del apetito, náuseas, congestión nasal.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: somnolencia severa, mareos, pupilas en forma de punto, pulso lento, enrojecimiento de la piel.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.