

Nombre: Tetraciclina Condición de venta: con receta médica Clasificación: antibiótico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado en el tratamiento de infecciones de la piel y tejidos blandos, tracto respiratorio, genitourinarias y oculares, gastrointestinales, debidas a microorganismos sensibles demostrado por antibiograma.

Este medicamento exige diagnostico y supervisión médica.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos: 1 a 2 g./24 horas es dosis divididas cada 6 o 12 horas dependiendo de la severidad del cuadro.

Niños mayores de 8 años: 25 -50 mg./Kg. divididos en 2 o 4 tomas dependiendo de cada caso. Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios.

La duración del tratamiento debe continuarse por 24 a 48 horas después que los síntomas han desaparecido.

Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe tomarlo con un vaso de agua para evitar la irritación del **esófago** o del estómago. Se debe tomar con el estómago vacío, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. No obstante, si se le producen molestias estomacales, tómelo junto con las comidas.

No debe consumir este medicamento con leche o con antiácidos.

- Uso prolongado

El uso prolongado de este medicamento, puede provocarle la aparición de infecciones por microorganismos que no son sensibles a tetraciclinas, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico. Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

3.- Precauciones

- Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de tetraciclina.

- **Manejo de vehículos**

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- **Embarazo**

Este medicamento puede causar daño al **feto** (puede causar decoloración en los dientes del bebé y alteraciones en el hígado de la embarazada), usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- **Lactancia**

Puede producir daños en el niño lactante como decoloración de dientes, retraso en el crecimiento de los dientes y los huesos, aumento de la sensibilidad a la luz solar y aumento de la probabilidad de contraer infecciones por hongos en la boca y la vagina, por lo que debe consultar con su médico antes de usar este medicamento si se encuentra amamantando.

- **Lactantes y niños**

Su uso en niños menores de 8 años puede causar decoloración permanente de los dientes. El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

Este medicamento no debe administrarse a niños menores de 4 años.

- **Precauciones especiales**

Si se encuentra tomando anticonceptivos orales que contengan estrógenos, debe tomar otras medidas de precaución para evitar el embarazo, ya que el uso de tetraciclina disminuye la eficacia de los anticonceptivos.

Debe evitar la exposición al sol o ir al solarium, ya que la tetraciclina hace la piel más sensible a la luz solar, provocando **rash** cutáneo, picor, enrojecimiento o decoloración de la piel, usted debe protegerse con un factor solar superior a 15.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a tetraciclina, doxiciclina, oxitetraciclina.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

En niños menores de 8 años.

En pacientes con insuficiencia renal moderada o grave.

5.- Interacciones

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: antiácidos, medicamentos con hierro, calcio, magnesio o zinc, warfarina, acenocumarol, glimidina, insulina, tolbutamida, cimetidina, digoxina, furosemida, ergotamina, metotrexato, metoxiflurano, penicilinas, resinas de intercambio iónico como colestiraminina, sales de litio, teofilina, anticonceptivos orales.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **diabetes insípida**.

- **Alimentos**

Es importante que tome la tetraciclina con dos horas de diferencia del consumo de cualquier producto lácteo (leche, queso, yoghurt, etc.), ya que estos alimentos disminuyen la acción del medicamento.

- **Exámenes de laboratorio**

Puede alterar los resultados de análisis de catecolaminas y **glucosa**, por lo que si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: calambres abdominales, oscurecimiento o decoloración de la lengua, **fotodermatitis**, **inflamación** de la mucosa de la boca, náuseas, vómitos.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: náuseas leves, diarrea leve, dolor de cabeza, picazón en la zona genital..

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C. La una vez reconstituída la suspensión debe mantenerse refrigerada a menos de 5° C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.