

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Tazaroteno

Crema Tópica 0,1%

Farmacoterapia del Acné

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento.

Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Guarde este folleto; puede necesitar leerlo nuevamente

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de crema contiene:

Tazaroteno 0,1 g

Excipientes detallar cualitativamente según fórmula autorizada por ISP

CLASIFICACIÓN:

Antipsoriásico y antiacneico

INDICACIONES

Tazaroteno está indicado en el tratamiento tópico de la psoriasis y del acné vulgaris de severidad media a moderada.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Tazaroteno debe aplicarse en las áreas afectadas una vez al día, preferentemente antes de acostarse. Se debe aplicar una fina capa del Crema, asegurándose que las áreas afectadas se encuentren limpias y secas. La aplicación no debe sobrepasar el 10% de la superficie de la piel. Normalmente el periodo de tratamiento es hasta por 12 semanas

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

En la medida de lo posible se debe evitar la aplicación del producto en las áreas de la piel sana circundantes a la placa psoriática, debido a su mayor sensibilidad a la irritación.

Se debe evitar el contacto con los ojos, boca, ángulos de la nariz o membranas mucosas. En caso de aplicación accidental, lavar inmediatamente con agua tibia.

No cubrir las áreas tratadas con vendajes oclusivos.

Se debe minimizar la exposición a la luz solar, incluyendo lámparas solares durante el uso de Tazaroteno. Si la exposición al sol no puede ser evitada, se recomienda utilizar ropa protectora o una pantalla solar sobre las áreas tratadas.

La seguridad y la eficacia de Tazaroteno en pacientes menores de 18 años no han sido establecidas.

Si se presenta una reacción que sugiere hipersensibilidad (reacción alérgica) o irritación severa, se debe discontinuar el uso del medicamento.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en pacientes alérgicos a Tazaroteno, derivados retinoicos o a cualquiera de los componentes de la formulación.

El producto no debe aplicarse sobre piel eczematosa, debido al riesgo de presentar irritación severa

No usar durante el embarazo o en mujeres que han previsto embarazarse

No usar durante la lactancia

INTERACCIONES

Se debe evitar el uso de medicamentos dermatológicos y cosméticos que posean un fuerte efecto secante o astringente. También se debe evitar su administración conjunta con medicamentos fotosensibilizantes (tiazidas, tetraciclinas, fluoroquinolonas, fenotiazinas, sulfonamidas) ya que pueden aumentar el riesgo potencial de fototoxicidad.

EFFECTOS NO DESEADOS

Eventualmente pueden aparecer signos de irritación, prurito, ardor, eritema, descamación, sequedad en la zona tratada o empeoramiento transitorio de la patología, efectos que usualmente no requieren atención médica. No obstante si continúan o se intensifican, consulte al médico.

SOBREDOSIS:

Ante la aplicación excesiva del medicamento se puede presentar un marcado enrojecimiento, descamación o molestias de la zona tratada, que de acuerdo a su severidad puede requerir atención médica

Ante la eventualidad de una ingestión accidental, consulte al médico o recurra a un centro asistencial.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Como todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener en su envase original

Almacenar en lugar fresco y seco

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.