

Nombre: Violeta de genciana Condición de venta: sin receta médica de uso tópico Clasificación: antiséptico Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza como desinfectante de uso externo.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

Se puede aplicar 2 a 3 veces al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Se debe aplicar sobre las mucosas orales o sobre la piel limpia.

- Uso prolongado

Se debe utilizar por 3 días seguidos si luego de este tiempo los síntomas persisten o empeoran debe consultar con su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

- Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

- Embarazo

No se ha observado que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el feto.

Lactancia

No se ha observado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño. No debe aplicar sobre los pechos.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Cuando lo utilice en lactantes, en las mucosas de la boca, se recomienda que después de aplicar el medicamento, ponga al lactante boca a bajo para minimizar la posibilidad de que trague el medicamento.

Este medicamento es de uso externo, debe evitar el contacto con los ojos.
Debe recordar que este medicamento puede manchar la piel y la ropa.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a violeta de genciana.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

- Enfermedades

Usted debe consultar con farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si padece de lesiones ulcerosa, ya que se puede tatuar la piel.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.