

<b>Nombre:</b> Verapamilo <b>Condición de venta:</b> con receta médica <b>Clasificación:</b> bloqueador de los canales de calcio <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial y para el alivio y tratamiento de la angina de pecho.

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 120-240 mg/día, repartidos en 2 o 3 dosis.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar este medicamento junto con las comidas o con leche.

#### - Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con verapamilo.

#### - Consumo de alcohol

Evite el consumo de alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento, ya que se aumentan los riesgos de efectos adversos de verapamilo.

#### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar mareos en algunos pacientes, ponga atención a estsi usted maneja algún vehículo u opera algún tipo de maquinaria.

#### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe conversar con su médico sobre la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada o desea estarlo.

#### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna, sin embargo, no se ha reportado que su uso durante la lactancia cause daño en el niño, no obstante consulte con su médico si está amamantando.

- **Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

- **Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

No debe dejar de tomar este medicamento sin la autorización de su médico, ya que se puede presentar un empeoramiento de los síntomas de su enfermedad.

Antes de realizarse una cirugía (incluso dental) o tratamiento de emergencia debe avisar al médico que se encuentra en tratamiento con este medicamento.

**4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a verapamilo.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

**5.- Interacciones**

- **Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: acetazolamida, amfotericina B, prednisona, hidroclorotiazida, furosemida, espironolactona, metazolamida, atenolol, propranolol, pindolol, carbamazepina, ciclosporina, procaiamida, quinidina, digoxina, disopiramida, betaxolol, levobunolol, metilpranolol, timolol.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **arritmias** cardíacas, insuficiencia cardíaca sistólica, depresión, **enfermedad de Parkinson**.

**6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: dificultad para respirar, tos, cambios en el ritmo del corazón, rash, disminución de los latidos del corazón, debilidad de las piernas, pérdida del control del balance, depresión, temblor de manos y dedos, dificultad para hablar, dolor en el pecho, secreción inusual de leche.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: constipación, diarrea, mareos, dolor de cabeza, debilidad.

**7.- Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: pulso extremadamente lento, mareos, fatiga.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **8. -Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

**No recomiende este medicamento a otra persona.**