

## CANDESARTÁN CILEXETILO – HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS

### Composición:

Los principios activos son candesartán cilexetilo e hidroclorotiazida.

Los otros ingredientes son: Según lo aprobado en Registro

Cada comprimido contiene:

candesartán cilexetilo: 16 mg

hidroclorotiazida: 12,5 mg

### ¿Qué es este medicamento y para qué se utiliza?

El candesartán cilexetilo es un tipo de medicamentos denominado antagonista de los receptores de angiotensina II, el cual actúa bloqueando a la hormona angiotensina II, lo cual causa relajación de los vasos sanguíneos y produce la disminución de la presión sanguínea.

La hidroclorotiazida pertenece a la clase de medicamentos llamados diuréticos. Su efecto es promover la excreción urinaria de sodio, cloruro y agua, lo cual resulta en la disminución de la presión sanguínea.

Este medicamento es utilizado para tratar la hipertensión (presión sanguínea elevada)

### Indicaciones:

Tratamiento de hipertensión esencial donde no resulta suficiente una monoterapia con Candesaratán cilexetilo o Hidroclorotiazida.

### Usted no debe tomar este medicamento

- Si está embarazada, piensa que puede estar embarazada o está intentando embarazarse
- Si está amamantando
- Si es alérgico a cualquiera de los otros componentes de este medicamento o a algún medicamento relacionado a hidroclorotiazida
- Si sufre de una enfermedad hepática severa
- Si sufre de una enfermedad renal severa
- Si sufre de gota

Importante: Usted no debe tomar este medicamento si en el pasado ha tenido problemas al usar medicinas que contienen candesartán cilexetilo o hidroclorotiazida

### Tenga especial cuidado :

Antes de tomar los comprimidos, informe a su médico o farmacéutico si:

- Si está tomando otros medicamentos para disminuir su presión sanguínea
- Si está tomando cualquier otro medicamento incluyendo aquellos comprados sin receta

- Si tiene cualquier problema cardíaco, hepático o renal
- Si sufre de intolerancia a la lactosa
- Si está tomando glucósidos digitálicos, antiarrítmicos, AINEs, colestipol, colestiramina, litio, diuréticos, laxantes, anfotericina, carbenoxolona, derivados de ácido salicílico, suplementos de potasio o sustitutos de sales
- Si es diabético

#### **Con alimentos y bebidas:**

No importa si usted toma el comprimido con o sin alimentos

#### **Embarazo:**

Antes de tomar este medicamento, indique a su médico si está embarazada o está intentando embarazarse

#### **Lactancia:**

Antes de tomar este medicamento, indique a su médico si está amamantando

#### **Anestesia y cirugía:**

Si usted va a tener una cirugía, indique a su médico o dentista que medicamento está tomando. Este medicamento combinado con algunos anestésicos puede causar una caída de la presión sanguínea

#### **Manejo y uso de maquinaria:**

El tratamiento para la presión sanguínea elevada puede ocasionar en algunos pacientes vértigo o cansancio.

#### **Otros medicamentos:**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando otros medicamentos, o si recientemente ha tomado cualquier otro medicamento, incluyendo aquellos no recetados

#### **Como tomar este medicamento:**

Es importante tomarlo cada día y según las instrucciones de su médico. Las instrucciones en este folleto deberían ayudarle a recordar lo que ha recomendado su médico.

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es :

1 comprimido al día. Se recomienda tomar el comprimido a la misma hora cada día, por ejemplo en la mañana.

No está recomendado para ser administrado en niños.

Si usted tiene la impresión de que el efecto es demasiado fuerte o débil, comuníquese con su médico.

#### **Si toma más medicamento de lo que debería:**

Contacte a su médico o acérquese al hospital más cercano para solicitar Asesoría.

#### **Si olvida tomar una dosis:**

No se preocupe, ignore la dosis olvidada y tome el siguiente comprimido a la hora habitual. Nunca tome una dosis extra para reemplazar la olvidada.

**Cuáles son los posibles efectos no deseados que podría experimentar:**

Al igual que con todos los medicamentos, algunas veces se experimentan efectos no deseados. Estos efectos usualmente son leves y desaparecen luego de un corto tiempo. Los efectos no deseados reportados muy raramente es hinchazón de la cara, labios, lengua y/o garganta, dolor de espalda, enrojecimiento, urticaria, picazón, reacciones inusuales en la piel, moretones, o fatiga extrema, ictericia (piel u ojos amarillos), aumento de los exámenes hepáticos. Si sufre de cualquiera de estos efectos o tiene cualquier otro síntoma inusual o inesperado, comuníquese con su médico inmediatamente

Muy rara vez, deterioro de la función renal (especialmente en pacientes con problemas renales existentes o falla cardíaca) ha sido reportado. Cambios en su potasio, sodio y en los niveles de células sanguíneas (hemograma) pueden ocurrir muy raramente, tales cambios son usualmente detectados por un examen sanguíneo.

**Presentación:**

Según lo aprobado en Registro.

**Almacenamiento:**

No tome los comprimidos después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Elimínelos en forma apropiada (consulte a su farmacéutico)

- Mantenga su medicamento en un lugar seguro, donde los niños no puedan verlos ni alcanzarlos. Los comprimidos pueden causarles un daño.
- Mantenga almacenados los comprimidos a menos de 30°C.
- Mantenga los comprimidos en el envase original.