

## **CINARIZINA COMPRIMIDOS 25 mg, 75 mg**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

### **COMPOSICION Y PRESENTACION:**

Cada comprimido contiene:

Cinarizina 25 o 75 mg

Excipientes: Según lo aprobado en Registro.

### **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Oral.

**CLASIFICACION:** Antivertiginoso, vasodilatador cerebral y periférico.

### **RECOMENDACIONES DE USO:**

Terapia de mantención para síntomas de trastornos laberínticos, cerebro vasculares, circulatorios periféricos, profilaxis de cinetosis y migraña.

**Este medicamento debe ser usado sólo por indicación de su médico.**

### **CONTRAINDICACIONES:**

- Hipersensibilidad al principio activo y/o algún componente de la formulación.
- Pacientes con historial depresivo o con síntomas preexistentes de Parkinson y otras alteraciones extrapiramidales.
- Hemorragia cerebral reciente.

### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

- No tome este medicamento si usted presenta alguna alergia a algún otro medicamento, edulcorante, colorante o saborizante. En caso de duda

consulte al farmacéutico.

- No utilizar en embarazo o lactancia salvo que los beneficios terapéuticos justifiquen los potenciales riesgos para el feto.
- Este producto puede causar molestias gástricas, la cual se puede disminuir ingiriéndolo con las comidas.
- Puede causar somnolencia, especialmente al inicio del tratamiento, por lo que se recomienda no conducir vehículos ni manejar maquinaria pesada.
- Informe a su médico, antes de realizarse un test cutáneo, de que está en tratamiento con este medicamento, ya que puede interferir con los resultados.
- Se recomienda evitar el consumo de alcohol u otros depresores del sistema nervioso central mientras se use cinarizina.

### **INTERACCIONES:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de:

- Alcohol
- Depresores del sistema nervioso central
- Antidepresivos tricíclicos (imipramina, amitriptilina, nortriptilina, clomipramina)
- Anticolinérgicos
- Heparina

### **EFFECTOS INDESEABLES O ADVERSOS:**

Los medicamentos pueden producir efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos requieren atención médica.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su médico, entre otros: somnolencias, mareos, trastornos digestivos, dolor epigástrico, temblor, rigidez, hipokinesia, náuseas, vómitos, aumento de peso, fatigas, reacciones cutáneas, vértigo, dolor de cabeza, sequedad de la boca, visión borrosa.

### **DOSIS:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su

caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

Trastornos de la circulación cerebral: 25 mg 3 veces al día o 75 mg una vez al día.

Trastornos de circulación periférica: 25 a 75 mg 3 veces al día.

Cinesitosis: 25 mg media hora antes de emprender el viaje, repetir cada 6 horas.

#### **FORMA DE ADMINISTRACION:**

Úsese este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia que la que su médico le indique.

Tome el medicamento con un vaso lleno de agua preferentemente después de la comidas.

#### **SOBREDOSIFICACION:**

En caso de ser ingerido en forma accidental en grandes cantidades, puede experimentar una excesiva sedación. Se recomienda acudir al centro de urgencia más cercano.

#### **PRESENTACION:**

Según lo aprobado en Registro.

#### **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor (a no más de 25°C), luz y humedad.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.**

**NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

**REVISADO EL 3 DE MAYO DEL 2007**