

DOMPERIDONA 10 mg- PSEUDOEFEDRINA 60 mg Cápsulas

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICION DEL PRODUCTO:

Cada cápsula contiene:

Domperidona	10 mg
Sulfato de Pseudoefedrina	60 mg
Excipientes:	Según lo aprobado en registro

INDICACIONES:

Indicado para el roncadador social severo, (RSS), que es aquel que molesta y que dificulta o impide la cohabitación. Es decir, impide el sueño de los acompañantes y en estos pacientes se usa este productol.

Nota:

El diagnóstico del roncadador severo lo efectúa normalmente el cónyuge o acompañante nocturno quién debe acudir al médico junto al paciente para proporcionarle antecedentes.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a la Domperidona y/o al Sulfato de Pseudoefedrina.

Es necesario que el médico descarte la presencia de hipertensión arterial o diabetes ya que tratando estas alteraciones se puede ingerir Faronkal sin inconvenientes. No debe usarse en personas con alteraciones urinarias marcadas secundarias a adenomas prostáticos como dificultad para orinar u orinar con frecuencia durante la noche.

La pseudoefedrina esta contraindicada en pacientes con Glaucoma y retención urinaria. También en pacientes con severos problemas de Hipertensión, insuficiencia cardiaca, hipotiroidismo.

La presencia de palpitaciones durante la administración constituiría una contraindicación absoluta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Usar sólo receta médica, el tratamiento debe ser supervisado por el médico quien evaluará los riesgos y beneficios.

No debe ser utilizado por personas con sensibilidad conocida a los componentes Pseudoefedrina o Domperidona.

Si al inicio del tratamiento se presentan palpitaciones, insomnio o inquietud severa, se deberá suspender la ingesta e informar al médico.

No debe ser utilizado por pacientes con alteraciones renales, hepáticas o prostáticas, retención urinaria, enfermedad arterial o coronaria severa, hipertensión o diabetes no controlada, hipertiroidismo.

Puede ser utilizado por pacientes con hipertensión o diabetes controladas bajo supervisión del médico.

No debe ser utilizado por pacientes con glaucoma. En caso de sufrir una poca complicación de glaucoma agudo caracterizado por fuerte dolor y ojo rojo, se deberá acudir inmediatamente a un médico o servicio de urgencia.

No debe ser utilizado durante período de embarazo y lactancia.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Los efectos de sobredosificación de la combinación de Domperidona y sulfato de Pseudoefedrina se relacionan directamente con los efectos de estas drogas por separado, tales como; somnolencia, reacciones extrapiramidales, desorientación, vértigo, dolor de cabeza, sudación, sed, taquicardia, palpitaciones, ansiedad, agitación e insomnio. Tratamiento: el paciente debe ser inducido al vómito y en caso que no se logre la emesis, se recurrirá al lavado gástrico con una solución salina fisiológica.

POSOLOGIA:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos: 1 cápsula 30 minutos antes de acostarse.

PRESENTACION:

Según lo aprobado en registro

Condiciones de almacenamiento:

Mantenga fuera del alcance de los niños. Mantenga en su envase original, según lo aprobado en registro No use este producto después de la fecha de vencimiento indicado en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

REVISADO EL 22 DE ENERO DEL 2007