

## **CINARIZINA**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su médico.

### **¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO?**

Cada comprimido contiene:

- Cinarizina 25 mg o 75 mg
- Excipientes: según lo aprobado en el registro.

Cada cápsula contiene:

- Cinarizina 75 mg
- Excipientes: según lo aprobado en el registro.

### **¿PARA QUE SE USA CINARIZINA?**

Terapia de mantenimiento para síntomas de trastornos laberínticos, cerebrovasculares, circulatorios periféricos, profilaxis de cinetosis y migraña.

### **¿CUÁL ES LA ACCIÓN TERAPEUTICA DE ESTE MEDICAMENTO?**

Antivertiginoso, vasodilatador periférico y cerebral.

### **¿CUÁNDO NO USAR CINARIZINA?**

- Hipersensibilidad al principio activo o drogas similares como flunarizina y/o algún componente de la formulación.
- Pacientes con historial depresivo o con síntomas preexistentes de Parkinson y otras alteraciones extrapiramidales.
- Hemorragia cerebral reciente.

### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO**

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y beneficios de su uso, los que deben ser discutidos entre usted y su médico. Considerar los siguientes aspectos:

#### **Pacientes alérgicos:**

Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.

#### **Embarazo y lactancia:**

Estudios realizados en animales no han mostrado efectos teratogénicos. A pesar de ellos debe usarse durante el embarazo y la lactancia sólo si los beneficios terapéuticos justifican los riesgos potenciales para el feto. Se desconoce si atraviesa a la leche materna por lo tanto en caso de real necesidad debe discontinuarse la lactancia.

#### **Uso pediátrico:**

No existen muchos estudios que avalen la seguridad del uso de cinarizina en pediatría, por lo tanto en caso de usar se debe bajo estricta vigilancia médica y después de realizar una adecuada evaluación de los riesgos beneficios para el paciente.

#### **Uso geriátrico:**

Debe ser administrado con precaución en pacientes ancianos y debe realizarse un monitoreo constante para detectar una posible acumulación de droga y con eso evitar la aparición de efectos secundarios.

#### **Consumo de alcohol y efectos en la capacidad de conducir y/o operar maquinaria:**

Cinarizina puede causar somnolencia especialmente al inicio del tratamiento, por lo tanto, debe tenerse cuidado cuando se administra en forma concomitante alcohol u otros depresores del sistema nervioso central y en los pacientes que deben conducir y operar maquinaria peligrosa.

#### **Otras precauciones:**

- Para evitar la aparición de distrés epigástrico, puede administrarse la droga después de las comidas, con lo que también se logra evitar la aparición de irritación gástrica.
- Se ha informado que en pacientes con tratamientos prolongados pueden empeorarse o aparecer síntomas extrapiramidales. No administrarse en pacientes con historia de hipersensibilidad a la droga.

### **¿QUÉ INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS PRESENTA ESTE MEDICAMENTO?**

Se ha determinado que cinarizina puede operar potenciando el efecto sedante de medicamentos como son: alcohol, depresores SNC, antidepresivos tricíclicos.

### **¿CÓMO ADMINISTRAR Y EN QUE CANTIDAD?**

La dosis debe ser la que su médico le indique. No use más o con mayor frecuencia que la que se le indica. Sin embargo las posologías más comunes son:

- Trastornos de la circulación cerebral: 1 comprimido de 25 mg, 3 veces al día, o 1 cápsula de 75 mg.
- Trastornos de la circulación periférica: 2 a 3 comprimidos de 25 mg 3 veces al día ó 2 a 3 cápsulas de 75 mg al día.
- Trastornos de equilibrio: 1 comprimido de 25 mg, 3 veces al día ó 1 cápsula de 75 mg al día.
- Cinetosis: en los adultos se recomienda 1 comprimido de 25 mg media hora antes de iniciar el viaje y continuar la administración cada 6 horas y en el caso de niños se recomienda administrar a la mitad de la dosis de adultos.
- Trastornos de la circulación cerebral vestibular y profilaxis de la jaqueca: 1 comprimido al día.

En general, para tratar trastornos del equilibrio, mareos y vértigos se recomienda un tratamiento sin interrupciones durante varias semanas. Se recomienda administrar preferentemente después de las comidas. La dosis máxima recomendada no debería exceder de 25 mg al día. El efecto de la cinarizina en vértigo es dependiente de la dosis, por lo tanto ésta debe aumentarse progresivamente.

No existen antecedentes sobre las dosis recomendadas para usar durante la hemodiálisis, dálisis peritoneal o hemofiltración arteriovenosa continua.

### **EFFECTOS NO DESEADOS:**

Los medicamentos pueden producir efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al médico si alguno de los síntomas ocurre: signos extrapiramidales (parkinsonismo, acatasia, discineia tardía orofacial), tinitus.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: somnolencia, dolor de cabeza, mareos, náuseas, dolor epigástrico, vómitos.

### **SOBREDOSIS:**

En caso de ingestión involuntaria acudir al centro de atención médico.

### **¿CÓMO ALMACENAR?**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz, humedad y a la temperatura señalada en el rótulo.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA

NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

Revisado: 15 febrero 2008