

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
AVAXIM PEDIÁTRICO VACUNA INACTIVADA  
ANTIHEPATITIS A, SUSPENSIÓN INYECTABLE 80 U**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**

**AVAXIM PEDIÁTRICO VACUNA INACTIVADA ANTIHEPATITIS A,  
SUSPENSIÓN INYECTABLE 80 U**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO**

AVAXIM PEDIÁTRICO, suspensión inyectable en jeringa precargada vacuna inactivada adsorbida contra la hepatitis A.

AVAXIM PEDIÁTRICO, suspensión inyectable en frasco multidosis vacuna inactivada adsorbida contra la hepatitis A.

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA**

Virus de la hepatitis A (cepa GBM)\* inactivado\*\* ..... 80 U\*\*\*

Para una dosis de 0,5 mL

\* Cultivada sobre células diploides humanas MRC-5

\*\* Adsorbido en hidróxido de aluminio 0,15 miligramos de Al)

\*\*\* por la falta de una referencia estandarizada, el contenido antigénico se expresa utilizando una referencia interna.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

Suspensión inyectable en jeringa precargada.

Suspensión inyectable en frasco multidosis.

La vacuna contra la hepatitis A (inactivada, adsorbida) es una suspensión turbia y blanquecina

**4. DATOS CLÍNICOS**

**4.1. Indicaciones terapéuticas**

AVAXIM PEDIÁTRICO se indica para la inmunización activa contra la infección causada

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE  
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS  
SECCIÓN PRODUCTOS NUEVOS

06 FEB 2018

N° Ref.: MT875576/17

N° Registro: B-2569/15

Firma Profesional:

FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PROFESIONAL

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
AVAXIM PEDIÁTRICO VACUNA INACTIVADA  
ANTIHEPATITIS A, SUSPENSIÓN INYECTABLE 80 U**

---

por el virus de la hepatitis A en niños entre 12 meses de edad y 15 años de edad inclusive. Esta vacuna se debe administrar conforme a las recomendaciones oficiales.

#### **4.2. Posología y forma de administración**

##### **Posología**

La vacunación primaria queda garantizada por una sola dosis de vacuna. La dosis recomendada es de 0,5 mL por cada inyección. Para asegurar una protección a largo plazo, está recomendado administrar una dosis de refuerzo entre 6 y 36 meses después de la primera inyección.

**Si ha pasado el tiempo recomendado para administrar la dosis de refuerzo, no es necesario volver a administrar nuevamente la dosis primaria.**

Se estima que los anticuerpos anti-VHA persisten varios años (~~durante más de~~ **hasta** 10 años) después de la segunda dosis (refuerzo).

##### **Forma de administración**

Esta vacuna se debe administrar por vía intramuscular.  
El lugar de inyección recomendado es la región del deltoides.

Excepcionalmente, la vacuna puede administrarse por vía subcutánea a pacientes con trombocitopenia o pacientes con riesgo de hemorragia.

La vacuna no se debe administrar en el músculo glúteo debido a la cantidad variable de tejido graso de esta región, que podría provocar variabilidad en la eficacia de la vacuna.

No inyectar por vía intravascular: asegurarse de que la aguja no penetre en un vaso sanguíneo.

No inyectar por vía intradérmica.

#### **4.3. Contraindicaciones**

- Hipersensibilidad al principio activo, a uno de los excipientes, a la neomicina (que puede estar presente en cada dosis como trazas, debido a su utilización durante la fabricación).
- Hipersensibilidad después de una inyección anterior de esta vacuna.
- La vacunación se debe posponer en caso de enfermedad febril aguda grave.

#### **4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo**

Como en el caso de cualquier vacuna inyectable, se recomienda disponer un tratamiento

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
AVAXIM PEDIÁTRICO VACUNA INACTIVADA  
ANTIHEPATITIS A, SUSPENSIÓN INYECTABLE 80 U**

---

médico apropiado y de vigilar al sujeto en caso de una eventual reacción anafiláctica después de la administración de la vacuna.

Se puede presentar síncope (desmayo) después, o incluso antes, de cualquier vacunación como respuesta psicógena a la inyección con aguja, especialmente en adolescentes. Puede venir acompañada de varios signos neurológicos como problemas transitorios de la visión, parestias y movimientos tónico-clónicos de las extremidades durante la fase de recuperación. Es importante contar con medidas de prevención para evitar lesiones en caso de desmayo.

AVAXIM PEDIÁTRICO no se ha estudiado en pacientes que presentan una inmunidad disminuida.

Un tratamiento inmunosupresor o un estado de inmunodeficiencia pueden inducir una disminución de la respuesta inmunitaria a la vacuna. Por lo tanto se recomienda esperar el fin de tratamiento para vacunar o verificar la adecuada protección de la persona. Sin embargo, se recomienda la vacunación de personas que presentan inmunodepresión crónica tal como una infección con VIH, a pesar de que la respuesta en anticuerpos podría ser limitada.

Dado el tiempo de incubación de la hepatitis A, la infección podría estar presente, aunque asintomática, en el momento de la vacunación.

El efecto de la administración de AVAXIM PEDIÁTRICO durante el período de incubación de la hepatitis A no se ha documentado.

En este caso, puede ocurrir que la vacunación no tenga efecto sobre el desarrollo de la hepatitis A.

La utilización de esta vacuna en personas que tienen una afección hepática deberá ser considerada con atención, dado que no se ha efectuado hasta ahora ningún estudio en estos individuos.

Como con todas las vacunas, la vacunación podría no generar una respuesta protectora en ciertas personas vacunadas.

La vacuna no protege contra la infección provocada por los virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, de la hepatitis E o por otros agentes patógenos conocidos del hígado.

#### **4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

Se puede practicar la administración simultánea de inmunoglobulinas con esta vacuna en dos lugares separados. No se modifican las tasas de seroprotección, pero los títulos de

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
AVAXIM PEDIÁTRICO VACUNA INACTIVADA  
ANTIHEPATITIS A, SUSPENSIÓN INYECTABLE 80 U**

---

anticuerpos pueden ser inferiores a los obtenidos cuando se administra esta vacuna sola.

En caso de administración simultánea, esta vacuna, no debe mezclarse con otras vacunas en la misma jeringa. Esta vacuna puede administrarse simultáneamente, en dos lugares separados, con el refuerzo de las vacunas de rutina del niño durante su segundo año de vida, o sean las vacunas conteniendo una o varias valencias tal y como: difteria, tétanos, pertussis (acelular o de germen entero), *Haemophilus influenzae* de tipo b y poliomielitis inactivada u oral.

La vacuna se puede administrar simultáneamente, pero en dos lugares de inyección diferentes, con una vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola.

Esta vacuna puede utilizarse como refuerzo en personas que hayan sido primovacunadas con otra vacuna inactivada contra la hepatitis A.

#### **4.6. Embarazo y lactancia**

##### Embarazo

No hay datos fiables de teratogénesis en animales.

No existen actualmente datos clínicos suficientemente pertinentes para evaluar un eventual efecto malformativo o fetotóxico de la vacuna contra la hepatitis A cuando se la administra durante el embarazo.

Por cautela, es preferible no utilizar esta vacuna durante el embarazo, excepto en caso de riesgo de contaminación importante.

##### Lactancia

La utilización de esta vacuna es posible durante la lactancia.

#### **4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas**

Los efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar máquinas no se han estudiado.

#### **4.8. Reacciones adversas**

Las reacciones adversas se derivan de estudios clínicos y de la experiencia posterior a la comercialización en el mundo.

En cada clase de sistemas de órganos, las reacciones se clasifican por frecuencia, con las reacciones más frecuentes en primer lugar, según la siguiente convención:



**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
AVAXIM PEDIÁTRICO VACUNA INACTIVADA  
ANTIHEPATITIS A, SUSPENSIÓN INYECTABLE 80 U**

---

Muy frecuentes ( $\geq 1/10$ ), Frecuentes ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ), Poco frecuentes ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ), Raras ( $\geq 1/10000$ ,  $< 1/1000$ ), Muy raras ( $< 1/10000$ ) incluidos los casos aislados.

### **Estudios Clínicos**

Durante los estudios clínicos, más de 3500 niños de 12 meses a 15 años de edad fueron vacunados con esta vacuna (unas 7000 dosis fueron administradas).

Todas las reacciones adversas fueron moderadas y limitadas a los primeros días después de la vacunación con regresión espontánea. Se han informado reacciones más raramente después de la administración de la dosis de refuerzo que después de la primera dosis.

Sin embargo, como para toda especialidad farmacéutica, es posible que se informen reacciones adversas más raras durante una utilización más amplia de la vacuna.

#### Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Frecuente: disminución del apetito

#### Trastornos psiquiátricos

Frecuente: irritabilidad, insomnio

#### Trastornos del sistema nervioso

Frecuente: cefaleas

#### Trastornos gastrointestinales

Frecuente: dolores abdominales, diarreas, náuseas, vómitos

#### Trastornos musculoesqueléticas y del tejido conjuntivo

Frecuente: artralgia, mialgia

#### Trastornos generales y afecciones en el lugar de la administración

Frecuente: reacciones locales en el lugar de la inyección, como dolor, enrojecimiento, edema o induración, fiebre, astenia

#### Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Poco frecuente: rash, urticaria

### **Experiencia posterior a la comercialización**

Con base en notificaciones espontáneas, las siguientes reacciones adversas también se han informado durante el uso comercial de AVAXIM PEDIÁTRICO. Estas reacciones se han informado con muy poca frecuencia; sin embargo, se desconoce la incidencia exacta (no es posible estimarla a partir de los datos disponibles).

#### Trastornos del sistema nervioso

Síncope vasovagal en respuesta a la inyección.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
AVAXIM PEDIÁTRICO VACUNA INACTIVADA  
ANTIHEPATITIS A, SUSPENSIÓN INYECTABLE 80 U**

---

**Notificación de sospechas de reacciones adversas**

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento.

**4.9. Sobredosis**

Parece improbable que una sobredosis provoque un efecto nocivo.

**5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

**5.1. Propiedades farmacodinámicas**

**Clase farmacoterapéutica: vacuna viral, código ATC: J07B C02**

Esta vacuna se prepara a partir del virus de la hepatitis A cultivado, cosechado e inactivado con formaldehído. Confiere inmunidad frente al virus de la hepatitis A, induciendo títulos de anticuerpos más durables y más elevados que los obtenidos después de una inmunización pasiva con inmunoglobulinas. Esta vacuna confiere títulos de anticuerpos protectores frente al virus de la hepatitis A ( $\geq 20$  mUI/ml) dentro de las dos semanas siguientes la inyección en más de 95 % de los sujetos y en 100 % de los sujetos antes de la administración de la dosis de refuerzo.

La inmunidad persiste de 6 a 36 meses y está reforzada por una dosis de refuerzo.

Actualmente no se ha establecido la persistencia a largo plazo, a un nivel protector, de los anticuerpos contra el virus de la hepatitis A después de una segunda dosis (refuerzo) de AVAXIM Pediátrico. Sin embargo, los datos disponibles sugieren que los anticuerpos contra el virus de la hepatitis A persisten durante más de 10 años después de la segunda dosis en personas sanas.

**5.2 Propiedades farmacocinéticas**

No se aplica.

**5.3. Datos preclínicos sobre seguridad**

Los datos no clínicos obtenidos en estudios convencionales de toxicología aguda, toxicología de dosis repetidas, tolerancia local e hipersensibilidad no han revelado riesgos específicos para el ser humano.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
AVAXIM PEDIÁTRICO VACUNA INACTIVADA  
ANTIHEPATITIS A, SUSPENSIÓN INYECTABLE 80 U**

---

**6. DATOS FARMACÉUTICOS**

**6.1. Lista de excipientes**

~~2-fenoxietanol, formaldehído, medio 199 Hanks\* (sin rojo de fenol) complementado con polisorbato 80.~~

~~\*El medio 199 Hanks es una mezcla compleja de aminoácidos (incluida la fenilalanina), de sales minerales, de vitaminas y de otros componentes, diluido en agua para inyectables y con un pH ajustado con ácido clorhídrico o hidróxido de sodio.~~

*(Colocar listado de excipientes de acuerdo a fórmula autorizada en el registro sanitario)*

**6.2. Incompatibilidades**

Por falta de estudio de compatibilidad, no se debe mezclar esta vacuna con otros medicamentos.

**6.3. Período de validez**

3 años.

**6.4. Precauciones especiales de conservación**

Presentación monodosis

Conservar en el refrigerador (entre +2 °C y +8 °C y al abrigo de la luz. No congelar.

**6.5. Naturaleza y contenido del recipiente**

Presentación monodosis

0.5 ml de suspensión en jeringa precargada (vidrio tipo 1) con o sin aguja - caja de 1, 10 ó 20.

Presentación multidosis

5 ml de suspensión en frasco (vidrio tipo 1) provista de un tapón (clorobutilo) - caja de 1 ó 10 frascos de 10 dosis.

**6.6. Instrucciones de uso, manipulación y eliminación**

Agitar antes de inyectar para obtener una suspensión homogénea.

La vacuna se debe inspeccionar visualmente antes de la administración para verificar la

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
AVAXIM PEDIÁTRICO VACUNA INACTIVADA  
ANTIHEPATITIS A, SUSPENSIÓN INYECTABLE 80 U**

---

ausencia de partículas extrañas.

El producto no utilizado o desechado se debe eliminar conforme la normativa vigente.

**7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

SANOFI PASTEUR S.A.

2, avenue Pont Pasteur

69007 LYON Francia.

**8. PRESENTACIÓN Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

Presentación monodosis

356 772-4: 0,5 ml de suspensión en jeringa precargada (vidrio tipo 1) con aguja - caja de 1.

356 774-7: 0,5 ml de suspensión en jeringa precargada (vidrio tipo 1) con aguja - caja de 10.

356 775-3: 0,5 ml de suspensión en jeringa precargada (vidrio tipo 1) con aguja - caja de 20.

356 777-6: 0,5 ml de suspensión en jeringa precargada (vidrio tipo 1) sin aguja - caja de 1.

356779-9: 0,5 ml de suspensión en jeringa precargada (vidrio tipo 1) sin aguja - caja de 10.

356 780-7: 0,5 ml de suspensión en jeringa precargada (vidrio tipo 1) sin aguja - caja de 20.

Presentación multidosis

356 770-1: 5 ml de suspensión en frasco (vidrio tipo 1) provista de un tapón (clorobutilo) – caja de 1 frasco de 10 dosis.

356771-8: 5 ml de suspensión en frasco (vidrio tipo 1) provista de un tapón (clorobutilo) - caja de 10 frascos de 10 dosis.

