

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DORMIK GLÓBULOS

**DORMIK
GLÓBULOS**

1. COMPOSICIÓN.

Cada 100 g de glóbulos contiene:

Atropa belladonna C6	0,25 mL
Coffea arabica C6	0,25 mL
Hyoscyamus niger C6	0,25 mL
Matricaria recutita C6	0,25 mL
Glóbulos de Sacarosa	100 g

2. CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA Y/O TERAPÉUTICA

Medicamento Homeopático.

3. MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa de acuerdo a las leyes homeopáticas y su descripción se encuentra en la Patogenesia descritas en las diferentes materias médicas homeopáticas.

4. ACCIÓN TERAPÉUTICA.

A continuación se describen las principales observaciones de la patogenesia de los principios que conforman esta formulación y que permiten la combinación de ellos para ampliar su acción.

Atropa belladonna: inflamaciones que cursen con fiebre alta.

Coffea arabica: actúa como inductor del sueño.

Hyoscyamus niger: estados de insomnio, inquietud y agitación.

Matricaria recutita: inflamación y espasmos del tracto gastrointestinal, dolores agudos, molestias de la dentición estados de irritación y mal humor.

5. INDICACIONES

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento del insomnio, calma y facilita el sueño en niños.

6. CONTRAINDICACIONES

Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

7. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Durante su utilización puede aparecer una agravación inicial de los síntomas, propio de los tratamientos homeopáticos, los cuales desaparecerán al continuar con el tratamiento. Mantener fuera del alcance de los niños.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DORMIK GLÓBULOS

8. EMBARAZO Y LACTANCIA

No existen restricciones para el uso indicado.

9. REACCIONES ADVERSAS

No descritas.

10. INTERACCIONES

No descritas.

11. TOXICOLOGÍA

No descritas a estas diluciones.

12. VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA

Vía de Administración: Uso Oral

Posología:

Niños menores de 1 año de edad: Administre 3 glóbulos por 3 veces al día, alejado de las comidas.

Niños a partir de 1 año y hasta 6 años de edad: administrar 8 glóbulos 3 veces al día, alejado del horario de comidas y especialmente en la noche.

Niños entre 6 y 12 años de edad: administrar 10 glóbulos 3 veces al día, alejado del horario de comidas y especialmente en la noche.

Duración del Tratamiento: Si no hay mejoría en un plazo de dos semanas o si presentan otros síntomas, se debe suspender su uso y consultar a médico tratante.

Modo de Uso: Los glóbulos deben tomarse media hora antes o media hora después de las comidas, permitiendo que se disuelvan lentamente en la boca. En bebés y niños muy pequeños disuelva los glóbulos en un poco de agua antes de su administración.

13. PERIODO DE EFICACIA

24 meses

14. PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 25°C.

15. CONDICIÓN DE VENTA

Venta directa en Establecimientos tipo A y B.

Elaborado y Distribuido por Knop Laboratorios S.A., Avda. Industrial 1198, Quilpué, Chile.
(www.knop.cl)