

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ESTOMAKIND COMPRIMIDOS****1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO**

Estomakind comprimidos

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA**


1 comprimido (100 mg) contiene:

**Active substances:****Sustancias Activas:**

Arsenicum album D6	20 mg
Croton tiglium D6	20 mg
Okoubaka D4	20 mg
Veratrum album D12	20 mg

**Excipientes:**

Para una lista completa de los excipientes, vea el apartado 6.1.

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

Comprimidos

**4. DATOS CLÍNICOS****4.1 Indicaciones terapéuticas**Coadyuvante en trastornos gastrointestinales ~~infantiles~~ en niños que cursan con náuseas, vómitos y diarrea.**4.2 Posología y forma de administración**~~Niños menores de 1 año de edad: En caso de molestias agudas, se administra 1 comprimido cada hora, hasta un máximo de 6 comprimidos por día.~~~~Cuando mejoran los síntomas, se administra 1 comprimido 4 veces por día.~~Niños entre 1 y 6 años de edad: En caso de molestias agudas, se administra 2 1 comprimido cada hora hasta un máximo de 12 6 comprimidos por día.Cuando mejoran los síntomas, se administra 2 1 comprimido 4 veces por día.Los comprimidos deben tomarse media hora antes o media hora después de las comidas, ~~admitiendo~~ permitiendo que se disuelvan lentamente en la boca. Si fuera necesario, los comprimidos deben disolverse en un poco de agua.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ESTOMAKIND COMPRIMIDOS**

**4.3 Contraindicaciones**

Hipersensibilidad a una de las sustancias activas o a uno de los excipientes.  
Niños menores de 1 año.

**4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo**

Si no se produce ninguna mejora dentro de 2 días o si las molestas recurren frecuentemente, conviene revalorar la terapia.

Este medicamento contiene lactosa, empleada como portador de trituraciones homeopáticas. Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lapp lactosa o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento.

**4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

No se han observado interacciones con otros medicamentos. El uso de este medicamento homeopático no excluye el uso de otros medicamentos.

**4.6 Embarazo y lactancia**

Este medicamento ha sido concebido para niños.

**4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas**

Este medicamento ha sido concebido para niños.

**4.8 Reacciones adversas**

Hasta ahora no se han observado efectos colaterales. Si se aprecian efectos colaterales, deben iniciarse medidas adecuadas.

Con el uso de los medicamentos homeopáticos se puede producir una agravación inicial de los síntomas existentes, en cuyo caso se debe suspender la administración y consultar al médico.

**4.9 Sobredosis**

No se ha informado sobre ningún caso de sobredosificación.

**5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

Grupo farmacoterapéutico: medicamento homeopático

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ESTOMAKIND COMPRIMIDOS**

La terapia homeoterapia se distingue marcadamente de la medicina convencional con respecto al entendimiento de la enfermedad y al uso de medicamentos. Los remedios homeopáticos estimulan los mecanismos de defensa propios del organismo, activando con ello su poder de autocuración. La reacción del organismo a un remedio homeopático es sumamente individual. Por este motivo, no pueden determinarse efectos farmacológicos específicos de la dosis, ni tampoco datos farmacodinámicos o farmacocinéticos.

**5.1 Propiedades farmacodinámicas**

No corresponde

**5.2 Propiedades farmacocinéticas**

No corresponde

**5.3 Datos preclínicos sobre seguridad**

No corresponde. Los comprimidos Estomakind, como medicamento homeopático de uso ampliamente establecido, no han sido sometidos a ensayos preclínicos.

**6. DATOS FARMACÉUTICOS****6.1 Lista de excipientes**

Celulosa microcristalina, talco, estearato de magnesio.

**6.2 Incompatibilidades**

No corresponde

**6.3 Período de validez**

~~24-36~~ (según lo aprobado en el registro sanitario) meses

**6.4 Precauciones especiales de conservación**

Mantenga el medicamento fuera del alcance y de la vista de niños.

No almacenar por sobre los ~~25~~ (según lo aprobado en el registro sanitario)° C. Guardar en el envase original.

**6.5 Naturaleza y contenido del envase**

Comprimidos, envasados en un frasco de vidrio con un contenido de ~~450~~ X comprimidos.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ESTOMAKIND COMPRIMIDOS**

**6.6 Precauciones especiales de eliminación**

No existen requerimientos especiales.

**7. IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y FABRICANTE**

Importador: ~~Paracelsus S.A., Carabobo 5930, Vitacura, Santiago. José Antonio Soffia 2747, oficina 304, Providencia, Santiago.~~ **Según lo inscrito en el registro sanitario**

Fabricante: ~~Deutsche Homöopathie Union, DHU Arzneimittel GmbH & Co KG, Ottostraße 24, 76227 Karlsruhe, Alemania.~~ **Según lo inscrito en el registro sanitario**

Distribuido por ~~Laboratorio PharmaIsa Ltda., Alcalde Guzmán 1420, Quilicura, Santiago~~  
**Según lo inscrito en el registro sanitario**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PROFESIONAL**