

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R37 COLINTESTON
SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO:

Dr. Reckeweg R37 Colinteston

2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:

Composición: 100 g de solución contiene: *Alumina* D12 10 g, *Bryonia* D4 10 g, *Colocynthis* D4 10 g, *Lycopodium* D4 10 g, *Nux vomica* D6 10 g, *Sulfur* D12 10 g

Excipientes: Etanol al 30% (m/m) c.s.p. 100 g

3. FORMA FARMACEUTICA:

Solución para Gotas Orales.

4. DATOS CLINICOS:

4.1 Indicaciones Terapéuticas:

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento del meteorismo y los cólicos intestinales.

4.2 Posología y forma de administración:

Vía de administración: Oral

Posología: En casos agudos tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

4.3 Contraindicaciones:

No se han reportado.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se describen interacciones con otros medicamentos o de otra naturaleza.

4.6 Embarazo y lactancia:

Durante el embarazo y lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar medicamentos. En todo caso, debe consultar al médico especialista.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

DR. RECKEWEG R37 COLINTESTON

SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES

4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

4.8 Reacciones adversas:

Al igual que todos los medicamentos DR. RECKEWEG® R37 COLINTESTON puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

4.9 Sobredosis:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS:

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

A. Alumina

Al₂O₃

Origen: químico

Usos medicinales: Estreñimiento, presión en el estómago, ardor de estómago, sen-sación de constricción.

B. Bryonia

Origen: vegetal

Usos medicinales: Presión y calambres en el estómago, heces duras y secas, estreñimiento.

C. Colocynthis

Origen: vegetal

Usos medicinales: Cólicos, se agravan al menor intento de comer y beber

A. Lycopodium

Origen: vegetal

Usos medicinales: Flatulencia, gases, estreñimiento.

B. Nux vomica

Origen: vegetal

Usos medicinales : Estreñimiento, dolores espasmódicas, sensación de hinchazón.

C. Sulfur

S

Origen: químico

Usos medicinales: Dispepsia, estómago irritable, náuseas y ardor de estómago, diarrea, estreñimiento.

6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R37 COLINTESTON
SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES

7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

8. PRESENTACION:

Frasco de 22 mL.

Frasco de 50 mL

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 25°C

Fabricado en Alemania por:

Pharmazeutische Fabrik

Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D-64625 Bensheim

www.reckeweg.de

Importado y Distribuido en Chile por:

Farmacéutica Caribbean Ltda.

Av. Américo Vespucio 1385, Módulo 7, Quilicura, Santiago.

por cuenta de:

Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda. Av. Presidente Riesco 5275,

Dpto. 103, Las Condes, Santiago.