

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ZOLPAST COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg**

---

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**

**ZOLPAST**

**ZOLPIDEM**

**COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg  
LABORATORIO PASTEUR S.A.**

**1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO**

Zolpast 10 mg comprimidos bucodispersables.

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA**

Cada comprimido bucodispersable contiene:

Zolpidem tartrato                      10 mg

Excipientes c. s.: **(Colocar listado cualitativo de excipientes de acuerdo a última fórmula autorizada)**

**3. FORMA FARMACÉUTICA**

Comprimido bucodispersable.

**4. DATOS CLÍNICOS**

**4.1. Indicaciones terapéuticas**

**Tratamiento del insomnio de corta duración ya sea de conciliación, de despertar precoz o por aumento del número de despertares nocturnos para terapia de dos a tres semanas. Tratamiento del insomnio por un período de hasta un mes.**

**4.2. Posología y forma de administración**

El medicamento actúa rápidamente y por lo tanto debe ser tomado inmediatamente antes de acostarse.

Al igual que todos los hipnóticos, no se recomienda el uso prolongado de Zolpast. La duración del tratamiento debe ser lo más corta posible. De forma general, la duración del tratamiento puede variar desde unos pocos días hasta dos semanas, con una duración máxima de cuatro semanas si se incluye la retirada gradual del medicamento.

En ciertos casos puede ser necesaria una prolongación del período máximo de tratamiento; si esto ocurre, no se realizará sin una reevaluación del estado del paciente.

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

### ZOLPAST COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg

---

**Posología:**

**General:** El tratamiento se debe administrar en una única dosis y no se debe administrar ninguna dosis adicional durante la misma noche.

La dosis diaria recomendada para adultos es 10 mg tomados por la noche inmediatamente antes de acostarse. Se debe utilizar la dosis diaria eficaz más baja de Zolpast y no se debe superar los 10 mg.

**Poblaciones especiales:**

*Población pediátrica:* No se recomienda Zolpast para su uso en niños y adolescentes menores de 18 años de edad, debido a la ausencia de datos que justifiquen el uso en este grupo de edad. La evidencia disponible procedente de ensayos clínicos controlados con placebo se presenta en la sección 5.1.

*Pacientes de edad avanzada:* En pacientes de edad avanzada o pacientes debilitados que pueden ser especialmente sensibles a los efectos de Zolpast, se recomienda una dosis de 5 mg.

La dosis total de Zolpast no debe exceder de 10 mg en esta población.

*Insuficiencia hepática:* Puesto que el aclaramiento y el metabolismo de Zolpast están reducidos en pacientes que padecen insuficiencia hepática, el tratamiento deberá iniciarse con una dosis de 5 mg teniendo especial precaución en pacientes de edad avanzada. En adultos (menores de 65 años) la dosis podrá ser aumentada hasta 10 mg solo cuando la respuesta clínica sea inadecuada y el medicamento esté bien tolerado.

**Forma de administración:** únicamente por vía oral.

#### 4.3. Contraindicaciones

Zolpast está contraindicado en pacientes con:

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.
- Miastenia gravis
- Síndrome de apnea del sueño
- Insuficiencia hepática grave
- Insuficiencia respiratoria aguda y/o grave.

#### 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo

**(Las benzodiazepinas y análogos a las benzodiazepinas están indicados solamente cuando la alteración es grave, incapacitante o somete al individuo a un extremo malestar)**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ZOLPAST COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg**

---

Se debería identificar las causas del insomnio siempre que sea posible y tratar los factores subyacentes antes de prescribir un hipnótico. Si después del tratamiento durante 7-14 días, no remite el insomnio, esto puede indicar la presencia de un trastorno primario físico o psiquiátrico, y se debería reevaluar cuidadosamente al paciente a intervalos regulares.

**Tolerancia**

Tras su uso repetido durante unas pocas semanas se puede desarrollar cierta pérdida de eficacia a los efectos hipnóticos de medicamentos sedantes/hipnóticos como Zolpast.

**Dependencia**

El uso de medicamentos sedantes/hipnóticos como Zolpast puede conducir al desarrollo de dependencia física y psíquica a estos medicamentos. El riesgo de dependencia aumenta con la dosis y la duración del tratamiento; es también mayor en pacientes con historia de alteraciones psiquiátricas y/o de abuso de alcohol o drogas. Se deben controlar estos pacientes mientras se encuentren en tratamiento con hipnóticos.

Una vez se haya desarrollado dependencia física, la interrupción brusca del tratamiento irá acompañada de síndrome de retirada. Este puede consistir en dolores de cabeza o dolor muscular, ansiedad extrema y tensión, inquietud, confusión e irritabilidad. En casos graves pueden aparecer los siguientes síntomas: alteración de la percepción de la realidad, despersonalización, hiperacusia, entumecimiento y hormigueo de las extremidades, hipersensibilidad a la luz, al ruido y al contacto físico, alucinaciones o convulsiones epilépticas.

**Insomnio de rebote**

Con la suspensión del tratamiento hipnótico puede ocurrir un síndrome transitorio por el que los síntomas que condujeron al tratamiento con medicamentos sedantes / hipnóticos, reaparecen de forma aumentada. Esto puede acompañarse de otras reacciones, incluyendo cambios de humor, ansiedad o trastornos del sueño e intranquilidad. Es importante que el paciente sea consciente de la posibilidad del fenómeno de rebote y por ello intentar minimizar la ansiedad sobre tales síntomas si éstos ocurren cuando cesa el tratamiento.

En el caso de los medicamentos hipnóticos/sedantes con una duración corta de acción, el fenómeno de retirada puede llegar a manifestarse dentro del intervalo de dosis. Ya que la probabilidad de aparición de un fenómeno de retirada/rebote es mayor después de finalizar el tratamiento bruscamente, se recomienda disminuir la dosis de forma gradual hasta su supresión definitiva.

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL ZOLPAST COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg

---

### **Duración del tratamiento**

La duración del tratamiento debe ser tan corta como sea posible (ver sección 4.2), sin exceder 4 semanas, incluyendo el período de disminución de dosis. La prolongación del tratamiento más allá de este periodo no se debe realizar sin reevaluar la situación.

### **Amnesia**

Medicamentos sedantes/hipnóticos como Zolpast pueden inducir amnesia anterógrada. Esto ocurre más a menudo varias horas después de ingerir el medicamento.

Para reducir el riesgo, los pacientes se deben asegurar de que van a poder disponer de un periodo de 8 horas de sueño ininterrumpido (ver sección 4.8).

### **Otras reacciones psiquiátricas y "paradójicas"**

Se sabe que otras reacciones psiquiátricas y paradójicas como intranquilidad, agravamiento del insomnio, agitación, irritabilidad, agresividad, delirio, ataques de ira, pesadillas, alucinaciones, psicosis, comportamiento anormal y otras alteraciones de la conducta ocurren con el uso de medicamentos sedantes/hipnóticos como Zolpast. Cuando esto sucede, el uso del medicamento debe ser suspendido. Es más probable que estas reacciones ocurran en pacientes de edad avanzada.

### **Sonambulismo y comportamientos asociados**

Se han notificado casos de sonambulismo y otros comportamientos asociados tales como conducción sonámbula, cocinar, comer, llamar por teléfono o tener relaciones sexuales con amnesia para estos acontecimientos en pacientes que habían tomado Zolpast y que no estaban totalmente despiertas.

El uso del alcohol y otros depresores del SNC con Zolpast, así como el uso de Zolpast a dosis que exceden la dosis máxima recomendada parece aumentar el riesgo de estos comportamientos. Se debería considerar seriamente la interrupción del tratamiento de Zolpast en pacientes que notifican estos comportamientos (por ejemplo, conducir en estado de sonambulismo) debido al riesgo para el paciente y otros (ver secciones 4.5 y 4.8).

### **Alteración psicomotriz al día siguiente**

El riesgo de alteración psicomotriz al día siguiente, incluida la alteración de la capacidad para conducir, aumenta si:

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

### ZOLPAST COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg

---

- Se administra la dosis de Zolpast con menos de 8 horas de margen antes de realizar actividades que requieran un estado de alerta mental (ver sección 4.7);
- Se administra una dosis mayor que la dosis recomendada;
- Se administra Zolpast en combinación con otro depresor del sistema nervioso central (SNC) o con otros fármacos que aumenten las concentraciones plasmáticas de Zolpast, o con alcohol o drogas (ver sección 4.5).

Zolpast se debe administrar una sola vez por la noche, inmediatamente antes de acostarse, y no se debe volver a administrar ninguna dosis adicional durante la misma noche.

#### **Lesiones graves**

Debido a sus propiedades farmacológicas, Zolpast puede producir somnolencia y un descenso del nivel de consciencia, que puede provocar caídas y consecuentemente causar lesiones graves.

#### **Grupos especiales de pacientes**

- **Pacientes de edad avanzada:**  
Ver la dosis recomendada en la sección 4.2.
- **Población pediátrica:**  
Ver sección 4.2.
- **Insuficiencia respiratoria:**  
Como los hipnóticos tienen la capacidad de deprimir la respiración, se debe tener precaución cuando se prescribe Zolpast a pacientes con la función respiratoria comprometida (ver sección 4.8).
- **Insuficiencia hepática:**  
Zolpast no se debe utilizar en pacientes con insuficiencia hepática grave ya que puede contribuir a la encefalopatía (ver secciones 4.2, 4.3 y 4.8).  
Ver las recomendaciones de dosis.
- **Enfermedades psicóticas:**  
Los hipnóticos tales como Zolpast no están recomendados para el tratamiento primario de las enfermedades psicóticas.
- **Depresión:**  
Aunque no se han demostrado interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas clínicamente relevantes con los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) (ver sección 4.5), al igual

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL ZOLPAST COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg

---

que con otros medicamentos sedantes/hipnóticos, se debe administrar Zolpast con precaución en pacientes que presentan síntomas de depresión.

La tendencia al suicidio podría estar presente, por lo tanto, se deberá dar la menor cantidad de Zolpast que sea factible a estos pacientes para evitar la posibilidad de una sobredosis intencionada por parte de estos pacientes. Durante el uso de Zolpast se puede desenmascarar una depresión pre-existente. Ya que el insomnio puede ser un síntoma de la depresión, el paciente debe ser reevaluado si el insomnio persiste.

Las benzodiazepinas y análogos a benzodiazepinas no deben ser empleados solos para tratar la depresión o la ansiedad asociada a depresión (el suicidio podría precipitarse en este tipo de pacientes).

Las benzodiazepinas y análogos a benzodiazepinas deben ser utilizados con extrema precaución en pacientes con historia de abuso de alcohol o drogas.

### **Advertencias sobre excipientes:**

Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o mala absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

### **4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

#### **Alcohol:**

La ingesta concomitante de alcohol no está recomendada.

El efecto sedante puede aumentar cuando el medicamento se utiliza en combinación con alcohol.

Esto afecta a la capacidad para conducir o utilizar maquinaria.

#### **Combinación con depresores del sistema nervioso central**

Puede potenciarse el efecto depresor del SNC si se usa en combinación con antipsicóticos (neurolépticos), hipnóticos, ansiolíticos/sedantes, antidepresivos, analgésicos narcóticos, antiepilépticos, anestésicos y antihistamínicos con efectos sedantes. Por consiguiente, el uso concomitante de Zolpast con estos medicamentos puede aumentar la somnolencia y la alteración psicomotriz al día siguiente, incluida la alteración de la capacidad para conducir (ver secciones 4.4 y 4.7). Asimismo, se han notificado casos aislados de

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**ZOLPAST COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg**

---

alucinaciones visuales en pacientes tratados con Zolpast junto con antidepresivos, incluidos bupropión, desipramina, fluoxetina, sertralina y venlafaxina.

La administración concomitante de fluvoxamina puede aumentar las concentraciones plasmáticas de Zolpast, por lo que no se recomienda su uso combinado.

En el caso de analgésicos narcóticos podría producirse también un incremento de la euforia que conduce a un aumento de la dependencia psíquica.

**Inhibidores e inductores CYP450:**

Los compuestos que inhiben el citocromo P450 pueden aumentar la actividad de algunos hipnóticos como Zolpast.

La administración concomitante de ciprofloxacino puede aumentar las concentraciones plasmáticas de Zolpast, por lo que no se recomienda su uso combinado.

Zolpast se metaboliza a través de varios enzimas citocromo P-450 hepáticos: siendo el enzima principal CYP3A4 con la contribución de CYP1A2. El efecto farmacodinámico de Zolpast disminuye cuando se administra con rifampicina (un inductor de CYP3A4). Sin embargo, cuando se administra Zolpast con itraconazol (un inhibidor de CYP3A4) no se modifican significativamente los efectos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Se desconoce la relevancia clínica de estos resultados.

La administración concomitante de Zolpast con ketoconazol (200 mg, dos veces al día), que es un potente inhibidor de CYP3A4, alargó la vida media de eliminación de Zolpast, aumentó el AUC total, y disminuyó el aclaramiento oral aparente al compararlo con Zolpast más placebo.

El AUC total de Zolpast durante el tratamiento conjunto con ketoconazol se incrementó en un factor de 1,83 en comparación con el tratamiento de Zolpast solo.

No se considera necesario el ajuste sistemático de la dosis, pero se deberá advertir que el uso de Zolpast con ketoconazol puede aumentar los efectos sedantes.

**Otros medicamentos:**

No se observaron interacciones farmacocinéticas significativas al administrar Zolpast con ranitidina, warfarina o digoxina.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ZOLPAST COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg**

---

**4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia****Embarazo**

No existen suficientes datos sobre Zolpast para evaluar su seguridad durante el embarazo y la lactancia.

Como medida de precaución, se debe evitar Zolpast durante el embarazo.

No hay datos disponibles o estos son limitados relativos al uso de Zolpast en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos o indirectos en términos de toxicidad para la reproducción. Si el medicamento es prescrito a una mujer en edad fértil, se le debe advertir que contacte con su médico para suspender el tratamiento si pretende quedarse embarazada o si sospecha que lo está.

Si Zolpast es administrado durante la última fase del embarazo o durante el parto, se pueden esperar efectos en el neonato, como hipotermia, hipotonía y depresión respiratoria moderada, debidos a la acción farmacológica del medicamento. Se han notificado casos de depresión respiratoria neonatal grave cuando se ha utilizado Zolpast con otros depresores del SNC al final del embarazo.

Por otra parte, los niños nacidos de madres que toman medicamentos sedantes / hipnóticos de forma crónica durante las últimas fases del embarazo, pueden desarrollar dependencia física y puede existir algún riesgo de desarrollar síntomas de retirada en el periodo postnatal.

**Lactancia**

Debido a que las benzodiazepinas y análogos a las benzodiazepinas se excretan por la leche materna, no se debe administrar Zolpast a las madres durante la lactancia.

**4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas**

La influencia de Zolpast sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es importante.

Se debe advertir a los conductores de vehículos y operarios de maquinaria que, tal y como sucede con otros hipnóticos, puede existir un riesgo de aletargamiento, prolongación del tiempo de reacción, mareo, somnolencia, visión borrosa/doble, disminución de la capacidad de alerta y alteración de la capacidad para conducir a la mañana siguiente del tratamiento (ver sección 4.8). Con el fin de reducir este riesgo, se recomienda un periodo de reposo de al



## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

### ZOLPAST COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg

---

menos 8 horas entre la administración de Zolpast y la conducción, el uso de maquinaria o cualquier trabajo que se realice en altura.

Se han observado casos de alteración de la capacidad para conducir y comportamientos como «conducción en estado somnoliento» en pacientes tratados en monoterapia con dosis terapéuticas de Zolpast.

Además, la combinación de Zolpast con alcohol u otros depresores del SNC aumenta el riesgo de que se manifiesten estos efectos (ver secciones 4.4 y 4.5). Se debe advertir a los pacientes de que no deben consumir alcohol ni otras sustancias psicoactivas mientras estén en tratamiento con Zolpast.

#### 4.8. Reacciones adversas

Se ha utilizado el siguiente criterio para la clasificación de la frecuencia de las reacciones adversas: muy frecuentes (= 1/10), frecuentes (= 1/100, < 1/10), poco frecuentes (= 1/1.000, < 1/100), raras (= 1/10.000, < 1/1.000) y muy raras (< 1/10.000). Frecuencia no conocida: no puede estimarse a partir de los datos disponibles.

Está demostrada la relación entre los efectos adversos y la dosis de Zolpast utilizada, particularmente en los casos de algunos efectos sobre el SNC. Tal y como se recomienda en la sección 4.2, teóricamente estos efectos deberían ser menores si Zolpast se administra inmediatamente antes de acostarse.

Las reacciones adversas ocurren con más frecuencia en pacientes de edad avanzada.

#### **Trastornos del sistema inmunológico**

*Frecuencia no conocida:* angioedema.

#### **Trastornos psiquiátricos**

*Frecuentes:* alucinaciones, agitación, pesadillas.

*Poco frecuentes:* estado confusional, irritabilidad.

*Frecuencia no conocida:* inquietud, agresividad, delirios, ataques de ira, psicosis, comportamiento anormal, somnambulismo (ver sección 4.4 Precauciones: Somnambulismo y comportamientos asociados), dependencia (la supresión del tratamiento puede provocar síntomas de retirada o efectos de rebote (ver sección 4.4), cambios en la libido, depresión (ver sección 4.4).

La mayoría de estos efectos adversos están relacionados con reacciones paradójicas.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ZOLPAST COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg**

---

**Trastornos del sistema nervioso**

*Frecuentes:* somnolencia, cefalea, mareo, agravamiento del insomnio, trastornos cognitivos tales como amnesia anterógrada (puede aparecer utilizando dosis terapéuticas. Este riesgo aumenta con dosis más altas). La aparición de amnesia puede asociarse con un comportamiento inapropiado (ver sección 4.4).

*Frecuencia no conocida:* disminución del nivel de consciencia, alteración de la atención, trastorno del habla.

**Trastornos oculares**

*Poco frecuentes:* diplopía.

**Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos**

*Frecuencia no conocida:* depresión respiratoria (ver sección 4.4).

**Trastornos gastrointestinales**

*Frecuentes:* diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal.

**Trastornos hepatobiliares**

*Frecuencia no conocida:* aumento de las enzimas hepáticas, daño hepático hepatocelular, colestásico, o mixto (ver secciones 4.2, 4.3 y 4.4).

**Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo**

*Frecuencia no conocida:* prurito, erupciones cutáneas, urticaria, hiperhidrosis.

**Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo**

*Frecuentes:* dolor de espalda.

*Frecuencia no conocida:* debilidad muscular.

**Infecciones e infestaciones**

*Frecuentes:* infección del tracto respiratorio superior e infección del tracto respiratorio inferior.

**Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración**

*Frecuentes:* fatiga.

*Frecuencia no conocida:* alteración de la marcha, tolerancia al producto, caídas (predominantemente en pacientes de edad avanzada y cuando Zolpast no se ha tomado de acuerdo con las recomendaciones prescritas) (ver sección 4.4).

**Depresión**

La utilización de benzodiazepinas y análogos a las benzodiazepinas puede desenmascarar una depresión existente. Ya que el insomnio puede ser un síntoma de la depresión, el paciente debe ser reevaluado si el insomnio persiste.

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

### ZOLPAST COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg

---

#### 4.9. Sobredosis

##### Signos y síntomas

En casos de sobredosis en los que están involucrados Zolpast solo o con otros depresores del SNC (incluyendo alcohol), se han notificado casos que van desde la alteración de la consciencia hasta el coma y muerte.

En los casos moderados, los síntomas incluyen: somnolencia, confusión mental y letargia. En casos más graves, los síntomas pueden incluir ataxia, hipotonía, hipotensión, depresión respiratoria, casos de deterioro de la consciencia hasta el coma y una sintomatología más grave incluyendo un desenlace mortal.

##### Tratamiento de la sobredosis

Tras la sobredosis con benzodiazepinas orales o análogos a las benzodiazepinas, se deben emplear medidas sintomáticas generales y de apoyo, inducir el vómito (antes de una hora) si el paciente está consciente o realizar lavado gástrico con protección de las vías respiratorias si el paciente está inconsciente. Si no se produce mejoría con el vaciado del estómago, se administrará carbón activado para reducir la absorción. Se realizará especial supervisión de las funciones respiratoria y cardiovascular en cuidados intensivos. No se deben emplear sedantes incluso en el caso en que el paciente presente excitación.

Flumazenilo puede utilizarse como antídoto cuando se hayan observados síntomas graves. Sin embargo, la administración de flumazenilo puede contribuir a la aparición de síntomas neurológicos (convulsiones).

Zolpast no se puede dializar.

## 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

### 5.1. Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: Fármacos relacionados con benzodiazepinas. Código ATC: N05CF02.

Zolpast, una imidazopiridina, es un agente hipnótico análogo a las benzodiazepinas. Se ha demostrado en estudios experimentales que posee efectos sedantes a dosis más bajas que las requeridas para ejercer efecto anticonvulsivante, miorrelajante o ansiolítico. Estos efectos están relacionados con una acción agonista específica en los receptores centrales pertenecientes al complejo del receptor macromolecular GABA-omega (BZ1 y BZ2) que modula la apertura del canal del ión cloro. Zolpast actúa principalmente sobre los subtipos de receptor omega (BZ1). La importancia clínica de este hecho no es conocida.

Durante los ensayos aleatorizados sólo se observaron pruebas convincentes de la eficacia con la dosis de 10 mg de Zolpast.

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

### ZOLPAST COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg

---

En un estudio aleatorizado doble ciego en el que participaron 462 voluntarios sanos de edad no avanzada con insomnio transitorio, la dosis de 10 mg de Zolpast redujo el periodo medio de tiempo hasta el sueño en 10 minutos frente al placebo, mientras que con la dosis de 5 mg de Zolpast la reducción fue de 3 minutos.

En un estudio aleatorizado doble ciego en el que participaron 114 pacientes de edad no avanzada con insomnio crónico, la dosis de 10 mg de Zolpast redujo el periodo medio de tiempo hasta el sueño en 30 minutos frente al placebo, mientras que con la dosis de 5 mg de Zolpast esta reducción fue de 15 minutos.

En algunos pacientes, podría ser eficaz una dosis más baja, como 5 mg.

#### Población pediátrica:

No se ha establecido la seguridad y eficacia de Zolpast en pacientes pediátricos menores de 18 años. Un estudio aleatorizado controlado con placebo en 201 niños con edades entre 6-17 años con insomnio asociado con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) no logró demostrar la eficacia de 0,25 mg/kg/día de Zolpast (con un máximo de 10 mg/día) comparado con placebo. Los acontecimientos adversos más frecuentes relacionados con el tratamiento con Zolpast frente a placebo fueron los trastornos psiquiátricos y del sistema nervioso e incluían mareo (23,5% vs 1,5%), dolor de cabeza (12,5% vs 9,2%) y alucinaciones (7,4% vs 0%) (ver sección 4.2).

## 5.2. Propiedades farmacocinéticas

### **Absorción**

Tras la administración oral, la biodisponibilidad de Zolpast es alrededor del 70%, alcanzando el máximo de concentración plasmática entre 0,5 y 3 horas tras la ingesta.

### **Distribución**

A dosis terapéuticas, la farmacocinética es lineal, el grado de unión a proteínas plasmáticas es de alrededor del 92%. La semivida plasmática de eliminación es aproximadamente 2,4 horas (0,7-3,5 horas). El volumen de distribución en adultos es de  $0,54 \pm 0,02$  l/kg.

### **Eliminación**

Zolpast se excreta en forma de metabolitos inactivos (metabolismo hepático), principalmente en orina (56%) y en heces (37%). No tiene efecto inductor sobre las enzimas hepáticas. En sujetos ancianos el aclaramiento está reducido. El pico de concentración plasmática está aumentado aproximadamente el 50% sin una prolongación significativa de la vida media (alrededor de 3 horas). El volumen de distribución disminuye a  $0,34 \pm 0,05$  l/kg en los muy ancianos.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
ZOLPAST COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES 10 mg**

---

En pacientes con insuficiencia renal, tanto dializados como no, existe una moderada reducción del aclaramiento. Los otros parámetros farmacocinéticos no se afectan.

***Insuficiencia hepática***

En pacientes con insuficiencia hepática, la biodisponibilidad de Zolpast está aumentada, el aclaramiento está reducido y la vida media de eliminación prolongada (aproximadamente 10 horas).

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

Mantener fuera del alcance de los niños.

Almacenar en su envase original a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Venta bajo receta médica retenida en establecimientos tipo A.



Fabricador:  
Athena Drug Delivery  
Solutions Pvt. Ltd.  
Plot A1-A5, Midc,  
Chemical Zone,  
Ambernath (West),  
Maharashtra,  
India.



Importado y distribuido por:  
Laboratorio Pasteur S.A.  
Ignacio Serrano 568  
Concepción, Chile  
Fono: (2)24383100  
[www.lpasteur.cl](http://www.lpasteur.cl)