

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
SPASCUPREEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES

-Heel

Folleto de Información al Profesional

X comprimidos sublinguales

Spascupreel® comprimidos sublinguales

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SECCIÓN PRODUCTOS NUEVOS	
30 SEP 2019	
N° Ref.:	MT1080884/18
N° Registro:	H-931/15
Firma Profesional:	

Medicamento homeopático
Hecho en Alemania

Composición: Cada comprimido contiene: *Citrullus colocynthis* D4 30 mg; *Ammonium bromatum* D4 30 mg; *Atropinum sulfuricum* D6 30 mg; *Veratrum album* D6 30 mg; *Magnesium phosphoricum* D6 30 mg; *Gelsemium sempervirens* D6 30 mg; *Passiflora incarnata* D2 15 mg; *Amanita muscaria* D4 15 mg; *Chamomilla recutita* D3 15 mg; *Cuprum sulfuricum* D6 15 mg; *Aconitum napellus* D6 60 mg. Como excipientes: estearato de magnesio y lactosa. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Indicaciones: Medicamento **homeopático** antiespasmódico.

Usos: Espasmos del estómago, intestino, vesícula biliar, dolores menstruales.

Modo de uso:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día.

Dosis pediátricas

6 -11 años	1 comprimido 2 veces al día
2 - 5 años	1 comprimido 1 a 2 veces al día
< 2 años	1 comprimido al día

Dosis aguda o inicial

Adultos y niños mayores de 12 años

1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

Dosis Pediátrica Aguda:

6 -11 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 8 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
SPASCUPREEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES****-Heel**

2 - 5 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 6 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

< 2 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 4 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

En niños menores de 6 años, se deben disolver los comprimidos en un poco de agua antes de administrarse.

Advertencias:

- Proteger del calor, de la luz solar directa y de la humedad.
- Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso.
- Si los síntomas son muy agudos o se acompañan de vómitos, fiebre, ictericia (coloración amarilla de la piel y parte blanca del ojo) y estos no ceden luego de la administración de las primeras dosis de este medicamento, se deberá reevaluar al paciente.
- Si los síntomas son leves a moderados y se mantienen o empeoran luego de 3 días de tratamiento, consulte al médico.
- La seguridad y eficacia del uso de este medicamento durante el embarazo o lactancia, no se ha establecido, por lo que se recomienda administrar bajo supervisión médica en dichos casos.
- Puede aparecer un agravamiento inicial de los síntomas, si esto ocurre se deberá suspender el tratamiento y reevaluar al paciente.

Contraindicaciones:

- Antecedentes de alergia al medicamento o a alguno de sus componentes, **especialmente a Chamomilla o a alguna otra planta de la familia de las Compuestas (Asteráceas).**
-
- No administrar en caso de trastornos atónicos del vaciado vesical, como por ej. adenoma prostático, ni a pacientes con glaucoma.

Efectos secundarios:

Puede producir midriasis y sequedad de la boca, si esto ocurre se debe reevaluar al paciente.

Interacciones con otros medicamentos:

No se han descrito en bibliografía.

Precaución: Este medicamento contiene lactosa.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
SPASCUPREEL COMPRIMIDOS SUBLINGUALES**

-Heel

Vía de administración: Sublingual.

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Bibliografía:

German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978. Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Vol. 1; 2° Ed.; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991.

Reg. I.S.P. N°.:H-931

Fabricado por y bajo licencia
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg – Str 2-4
76532 Baden - Baden
Alemania

Importado y distribuido por:
Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos 260, piso 6
Las Condes - Santiago . Chile

