

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
ENO REGULAR SAL DE FRUTA

SAL DE FRUTA ENO^{MR}
Sabor Regular

FOLLETO INFORMACIÓN AL PACIENTE

Lea cuidadosamente este folleto antes de administrar este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Vía de Administración: Oral


Composición:

Cada 100 g de polvo efervescente sabor regular contiene:

Bicarbonato de sodio 46,13 g;

Ácido cítrico 43,87g;

Carbonato de sodio 10,00g.



Cada 5 g (1 sobre o 1 cucharada de 5 ml) contiene 0,85 g de sodio.

Clasificación: Antiácido

Indicaciones:

Alivio sintomático y temporal de las molestias derivadas de la hiperacidez estomacal.

Contraindicaciones

No tome este medicamento si ~~Ud.~~:

~~Es alérgico a este medicamento o a alguno de sus componentes, al bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, ácido cítrico o a alguno de los otros componentes de la fórmula. Si tiene problemas hepáticos, cardíacos o renales, presión arterial elevada,~~

~~Presenta hipocalcemia, enfermedades renales o hepáticas graves (insuficiencias) dolor abdominal, vómitos, fiebre, pacientes con úlceras. Sigue una dieta baja en sodio~~

Embarazo y Lactancia: Consulte a su médico si usted está embarazada o está amamantando antes de usar este medicamento.

Precauciones y Advertencias

a) Interacciones Este producto reduce la acidez estomacal y puede interferir con la absorción de otros medicamentos. Por este motivo, se recomienda espaciar la administración de este y de otros medicamentos

~~El efecto de un medicamento puede ser modificado por su administración junto con otros (interacción). Es muy importante que consulte con el farmacéutico la conveniencia de usar ENO si está tomando otros medicamentos.~~

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
ENO REGULAR SAL DE FRUTA

~~Contiene 0,85 g de sodio por sobre. Las personas con una dieta sodio-restringida deben consultar al médico antes de tomar este producto.~~

Precauciones y Advertencias

~~En caso de sufrir alguna enfermedad, tomar otros medicamentos o requerir atención médica por otras razones, consulte con el médico antes de tomar este medicamento~~

~~En caso de requerir atención médica por otras razones no olvide mencionar que está tomando este medicamento.~~

b) Presencia de otras enfermedades

~~El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe consultar al médico antes de ingerir este medicamento, especialmente si usted:~~

~~Es hipertenso o está en tratamiento con diuréticos.~~

~~Presenta dificultad para orinar (ausencia o poca cantidad de orina).~~

~~e) No tome este medicamento sin antes consultar al farmacéutico si Ud. presenta alguna alergia ya sea a otro medicamento, colorante, edulcorante o saborizante.~~

~~d) No tome este medicamento por más de 14 días, si los síntomas persisten o empeoran, consulte al médico. No exceda la dosis indicada.~~

Efectos adversos (no deseados):

~~No serios: irritaciones gástricas o intestinales, que pueden producir gases e hinchazón.~~

~~Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Cualquier medicamento puede producir efectos no deseados especialmente si se toma por un período prolongado de tiempo y/o en dosis grandes.~~

~~Casualmente se puede presentar los efectos siguientes debido a sus propiedades farmacológicas: Eructos (se considera un efecto beneficioso), flatulencia, distensión abdominal (debido a la liberación de anhídrido carbónico). Si se consumió en cantidades excesivas, la presencia de bicarbonato de sodio puede causar los calambres del estómago, eructos y flatulencia así como carga excesiva de sodio o alcalosis metabólica. Estas molestias desaparecen al suspender el medicamento.~~

Dosis y forma de administración:

~~**Los adultos y niños mayores de 12 años:** 5 g (un sobre o una cucharada de 5 ml de polvo) disuelto en un vaso con $\frac{3}{4}$ partes de agua.~~

~~La dosificación puede repetirse cada 2- 3 horas hasta 4-2 veces al día.~~

~~Intervalo mínimo de dosificación: 2 horas.~~

~~La dosis diaria máxima (DDM): 4-2 sobres de 5 g.~~

~~El periodo máximo de uso de antiácidos a DDM es de 14 días.~~

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
ENO REGULAR SAL DE FRUTA

Condiciones de Almacenamiento:

Guarde en un lugar seco y a temperatura menor de 30°C.

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No recomiende este medicamento a otra persona.



