


Johnson + Johnson®

MYLANTA® Rolltabs Sabor Cereza
Comprimidos Masticables

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL SUBDEPTO. REGISTRO UNIDAD PRODUCTOS FARMACEUTICOS NUEVOS	
10 MAR 2010	
Nº Ref.	RF 156659/09
Nº Registro	F-17003/10
Firma Profesional	

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL MÉDICO PROFESIONAL

Composición

Cada comprimido de MYLANTA Rolltabs Sabor Cereza Comprimidos Masticables contienen:
Carbonato de Calcio 550 mg e Hidróxido de magnesio 110 mg.

Excipientes: Almidón pregelatinizado, ~~Acesulfame~~ **Acesulfamo** de potasio, sabor artificial de Cereza en polvo 13571401, colorante D&C rojo # 27, estearato de magnesio, **dextrosa, c.s.**

Indicaciones

Antiácido.

Alivio de la acidez y ardor estomacal.

Vía de Administración

Oral.

Dosis

Masticar 1 – 4 comprimidos cuando se presenten los síntomas, repetir después de 1 hora si persisten los síntomas.

Advertencias

No tomar más de 12 comprimidos en el período de 24 horas. No usar la dosis máxima por más de dos semanas, puede incrementar el riesgo de encefalopatía en pacientes en diálisis. Forma complejos insolubles con fosfatos disminuyendo su absorción, pudiendo resultar en hipofosfatemia si la ingesta de fosfatos no es adecuada y la excreción renal es disminuida.

Contraindicaciones

No usar en insuficiencia renal, las partículas de magnesio pueden acumularse y producir depresión del SNC y otros síntomas de hipermagnesemia. No usar en hipercalcemia, hemorroides, diarrea crónica, hipoparatiroidismo, sarcoidosis, apendicitis, sangrado gastrointestinal o rectal, obstrucción intestinal, colitis ulcerativa, ileostomía, constipación, insuficiencia cardíaca congestiva, edema, toxemia del embarazo, cirrosis. Sensibilidad a alguno de los componentes.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL

Precauciones

En embarazo o lactancia, consulte al médico. No administrar a niños menores de 6 años. **En niños menores de 12 años, la dosis debe ser indicada por el médico.**

Interacciones

Puede interactuar con: anticolinérgicos, quinolonas, digitálicos, antihistamínicos, hierro, ketoconazol, fenotiazinas, fenitoína, fosfatos, salicilatos, sucralfato, tetraciclinas, y vitamina D.

Reacciones Adversas

Sabor terroso en la boca.

Por el uso prolongado, dosis altas o pacientes con insuficiencia renal: neurotoxicidad, diarrea moderada, alcalosis metabólica, hipermagnesemia, constipación severa.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSERVAR A MENOS DE ~~30~~**25**°C.
VENTA SIN RECETA MÉDICA. SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN CONSULTE A SU MÉDICO.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL