


¿QUÉ ES UN ESAVI?

Los ESAVI son eventos adversos que no necesariamente corresponden a reacciones adversas comprobadas, y algunos pueden haber ocurrido independientemente de la vacunación, es por ello que poseen el término “supuestamente asociado con la vacunación”, tal sospecha sólo se puede confirmar o descartar después de un análisis detallado.

Los ESAVI son monitorizados constantemente y analizados por este Instituto, priorizando su análisis según seriedad de los mismos de acuerdo al siguiente flujo de trabajo:



* FVV: Farmacovigilancia de Vacunas

Para mayor información puede acceder al siguiente enlace:
<https://www.ispch.cl/anamed/farmacovigilancia/vacunas/>

NOTIFICACIONES DE ESAVI EN PERSONAS DESDE LOS 18 AÑOS, RECIBIDAS EN EL SUBDEPARTAMENTO FARMACOVIGILANCIA

Intervalo: 24 de diciembre de 2020 hasta 20 de noviembre 2021

14.014

Reportes de ESAVI fueron recibidos

0,04%

De las personas vacunadas han reportado un ESAVI

39,7

Fue la tasa de notificación cada 100.000 dosis administradas

Vacunas utilizadas en Chile

AstraZeneca
CanSino
Pfizer-BioNTech
Sinovac

Dosis administradas

AstraZeneca (3.092.789)
CanSino (573.678)
Pfizer-BioNTech (11.138.742)
Sinovac (20.507.367)

TOTAL DE DOSIS ADMINISTRADAS

(35.312.576)

DISTRIBUCIÓN DE LOS REPORTES SEGÚN SERIEDAD

94,9%

Del total de notificaciones corresponden a **ESAVI No serio**, vale decir se presentaron 37,6 notificaciones no serias cada 100.000 dosis administradas


5,1%

Del total de notificaciones corresponden a **ESAVI serio**, vale decir el 2,0 notificaciones serias cada 100.000 dosis administradas


COMPARACIÓN DE LAS TASAS DE NOTIFICACIÓN DE ESAVI DE LAS VACUNAS SARS-CoV-2 APROBADAS Y UTILIZADAS EN CHILE

Intervalo: 24 de diciembre de 2020 hasta 20 de noviembre 2021

Tasa de notificación de ESAVI no serio por tipo de vacuna por cada 100.000 dosis administradas



Tasa de notificación de ESAVI serio por tipo de vacuna por cada 100.000 dosis administradas



VACUNA SARS-COV-2 SINOVAC

DISTRIBUCIÓN DE NOTIFICACIONES

28,7


Notificaciones de ESAVI
no serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna

1,7

Notificaciones de ESAVI
serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna

Tasa de notificaciones según sexo y grupo etario

- Tasa de notificación de ESAVI
por cada 100.000 dosis
administradas sexo femenino
- Tasa de notificación de ESAVI
por cada 100.000 dosis
administradas sexo masculino



Tasas por cada 100.000 dosis administradas de los ESAVI más frecuentemente reportados

10,8
Cefalea

9,7
Reacción local
en la zona de
inyección

3,7
Mialgia

3,5
Prurito

2,9
Náuseas

VACUNA SARS-COV-2 PFIZER-BIONTECH

DISTRIBUCIÓN DE NOTIFICACIONES

50,5


Notificaciones de ESAVI
no serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna

1,8

Notificaciones de ESAVI
serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna

Tasa de notificaciones según sexo y grupo etario

- Tasa de notificación de ESAVI
por cada 100.000 dosis
administradas sexo femenino
- Tasa de notificación de ESAVI
por cada 100.000 dosis
administradas sexo masculino



Tasas por cada 100.000 dosis administradas de los ESAVI más frecuentemente reportados

34,9
Reacción local
en la zona de
inyección

21,9
Cefalea

10,2
Fiebre

9,6
Malestar
general

9,5
Mialgia

VACUNA SARS-COV-2 CANSINO

DISTRIBUCIÓN DE NOTIFICACIONES

36,8


Notificaciones de **ESAVI no serio** por cada 100.000 dosis administradas fueron reportadas para esta vacuna

1,7

Notificaciones de **ESAVI serio** por cada 100.000 dosis administradas fueron reportadas para esta vacuna

Tasa de notificaciones según sexo y grupo etario

- Tasa de notificación de ESAVI por cada 100.000 dosis administradas sexo femenino
- Tasa de notificación de ESAVI por cada 100.000 dosis administradas sexo masculino



Tasas por cada 100.000 dosis administradas de los ESAVI más frecuentemente reportados

19,3
Cefalea

12,0
Reacción local
en la zona de
inyección

8,7
Fiebre

7,7
Malestar
general

7,0
Mialgia

VACUNA SARS-COV-2 ASTRAZENECA

DISTRIBUCIÓN DE NOTIFICACIONES

37,9


Notificaciones de ESAVI
no serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna

5,4

Notificaciones de ESAVI
serio por cada 100.000
dosis administradas fueron
reportadas para esta vacuna

Tasa de notificaciones según sexo y grupo etario

- Tasa de notificación de ESAVI por cada 100.000 dosis administradas sexo femenino
- Tasa de notificación de ESAVI por cada 100.000 dosis administradas sexo masculino



Tasas por cada 100.000 dosis administradas de los ESAVI más frecuentemente reportados

24,3

Reacción local
en la zona de
inyección

18,3

Cefalea

8,9

Fiebre

8,7

Mialgia

4,2

Escalofríos